PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2026

CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALIZADO - ENDODONTIA

ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES A SEGUIR.

- Verifique se o Caderno de Questões está completo e se o cargo indicado corresponde à sua inscrição. Havendo qualquer irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- A prova tem duração de 3 horas e 30 minutos, incluído o tempo destinado ao preenchimento da Folha de Respostas. O tempo mínimo de permanência em sala é de 1 hora e 45 minutos.
- Este caderno contém 40 questões objetivas. Utilize-o apenas como rascunho. As respostas somente serão consideradas válidas quando assinaladas na Folha de Respostas.
- Na Folha de Respostas, marque apenas uma alternativa por questão, utilizando caneta esferográfica azul ou preta. Questões com dupla marcação, rasuradas ou em branco serão anuladas.
- Não haverá substituição do Caderno de Questões nem da Folha de Respostas por erro do candidato.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos, após a assinatura da ata.
- Não se esqueça de assinar e registrar sua impressão digital na Folha de Respostas a ser entregue ao fiscal no final da prova.
- Somente será permitido ao candidato levar consigo o Caderno de Questões nos 30 (trinta) minutos que antecedem o horário oficial de término da prova. Caso o candidato deixe a sala antes desse tempo, deverá entregar ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, esta devidamente assinada e com a impressão digital registrada.
- O candidato que deixar a sala antes dos 30 minutos finais do tempo de duração da prova e não devolver o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, terá sua prova anulada.

✂----------

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2026

O espaço abaixo é destinado à anotação das respostas. Este canhoto poderá ser levado consigo. Solicite ao fiscal que o destaque.
A divulgação dos editais de resultado está prevista para quarta-feira a partir das 18h nos sites: www.ibamsp-concursos.org.br/ e dom.maua.sp.gov.br

01-	02-	03-	04-	05-	06-	07-	08-	09-	10-
11-	12-	13-	14-	15-	16-	17-	18-	19-	20-
21-	22-	23-	24-	25-	26-	27-	28-	29-	30-
31-	32-	33-	34-	35-	36-	37-	38-	39-	40-

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 3.

A alfabetização em saúde bucal, em sua essência, refere-se à capacidade do indivíduo de obter, processar e compreender informações relevantes sobre saúde bucal, de modo a tomar decisões informadas e adequadas. No Brasil, estudos indicam um baixo nível de alfabetização em saúde, frequentemente corroborado por uma comunicação deficiente entre profissionais e pacientes. Essa lacuna na comunicação gera baixa adesão ao tratamento e insatisfação com os resultados, revelando que a falta de alfabetização pode dificultar a tomada de decisões compartilhadas, um aspecto importante para o sucesso no tratamento de quaisquer condições de saúde.

Doenças bucais não transmissíveis, como cárie dentária, gengivite e doença periodontal, são, em grande parte, preveníveis. No entanto, o acesso limitado à informação sobre saúde bucal ainda é uma realidade para muitos. A falta de conhecimento pode não apenas facilitar a incidência de tais doenças, mas também agravar condições já existentes. Indivíduos com conhecimento limitado tendem a buscar atendimento odontológico apenas em condições emergenciais, frequentemente enfrentando problemas dentários que poderiam ter sido evitados com intervenções precoces.

Esse comportamento não só impacta a frequência dos atendimentos preventivos, mas também resulta em custos mais elevados para os serviços de saúde. O tratamento em estágios avançados frequentemente requer intervenções cirúrgicas e protéticas que são financeiramente onerosas. Além disso, ao lidarem com problemas bucais estabelecidos, muitos pacientes experienciam um aumento da ansiedade e do medo em relação ao tratamento odontológico. Essa situação gera estresse e, consequentemente, aumenta as chances de insucesso no tratamento, uma vez que a compreensão e a adesão às recomendações no momento do atendimento podem ser comprometidas.

Para que a comunicação e a interação entre profissionais de saúde e pacientes sejam efetivas, é imperativo que os profissionais conheçam o nível de alfabetização de seus pacientes. Essa compreensão permitirá a adaptação das abordagens educacionais e informativas, facilitando o processo de empoderamento do paciente, promovendo uma maior adesão e melhores resultados em saúde.

OLIVEIRA, Fernanda Maria Machado Pereira Cabral de et al. Alfabetização em saúde como propulsor da autonomia para o autocuidado. Jornal da USP, São Paulo, 8 ago. 2025. Disponível em: https://jornal.usp.br/artigos/alfabetizacao-em-saude-como-propulsor-da-autonomia-para-o-autocuidado/. Acesso em: 30 set. 2026. (Adaptado.)

Questão 01

(Correta: B)

Ao reelaborar informações do texto para um relatório sobre adesão ao tratamento odontológico, um profissional produziu versões em que a ordem dos termos e a estrutura das orações foram alteradas, o que afeta diretamente as relações de concordância entre sujeito e verbo.

Considerando as regras de concordância da norma-padrão, assinale a alternativa em que a reescrita está correta.

(A) Para o sucesso do tratamento odontológico, é necessário que se conheça, desde a primeira consulta, os níveis de alfabetização de cada paciente.

(B) No tratamento em estágios avançados, requerem-se, com frequência, intervenções cirúrgicas e protéticas que se mostram financeiramente onerosas.

(C) Devem haver, entre os pacientes com conhecimento limitado sobre saúde bucal, aqueles que adiam a ida ao dentista até as situações emergenciais.

(D) O aumento da ansiedade e do medo diante dos tratamentos, comum entre pacientes com problemas estabelecidos, comprometem a adesão às orientações.

Questão 02

(Correta: B)

O texto examina de que modo o nível de alfabetização em saúde bucal interfere na relação entre pacientes e profissionais, encadeando um diagnóstico, as consequências dele decorrentes e uma recomendação final. A leitura adequada exige distinguir o que o texto apresenta como causa, o que apresenta como efeito e o que propõe como encaminhamento.

Considerando a progressão argumentativa do texto, assinale a alternativa correta.

(A) Os custos elevados mencionados no texto resultam da preferência dos pacientes por intervenções cirúrgicas e protéticas em detrimento dos atendimentos de prevenção.

(B) A responsabilidade pela qualidade da comunicação recai também sobre o profissional, pois conhecer o nível de alfabetização do paciente é condição para orientá-lo bem.

(C) A ansiedade diante do tratamento é apontada como origem da baixa alfabetização em saúde bucal, uma vez que o medo afasta o paciente das informações sobre prevenção.

(D) As doenças bucais não transmissíveis são apresentadas como decorrência direta da falta de informação, razão pela qual seriam evitáveis por meio de ações educativas.

Questão 03

(Correta: B)

Na construção da coesão do texto, o autor emprega

expressões que retomam porções anteriores, muitas vezes condensando-as em um termo de valor resumitivo. A identificação do referente exige considerar o parágrafo em que cada expressão aparece e o conteúdo que ela efetivamente recupera.

Associe as expressões transcritas do texto Coluna 1 aos conteúdos que elas retomam Coluna 2.

Coluna 1

1."Essa lacuna" (1º parágrafo).

2."tais doenças" (2º parágrafo).

3."Esse comportamento" (3º parágrafo).

4."Essa situação" (3º parágrafo).

Coluna 2

(__)A procura por atendimento odontológico restrita a condições emergenciais.

(__)O aumento da ansiedade e do medo em relação ao tratamento odontológico.

(__)A cárie dentária, a gengivite e a doença periodontal, em grande parte preveníveis.

(__)A comunicação deficiente entre profissionais de saúde e pacientes.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

(A) 3, 1, 2, 4.
(B) 3, 4, 2, 1.
(C) 1, 4, 2, 3.
(D) 4, 3, 2, 1.

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 4 a 5.

A saúde bucal é uma área de discussão fundamental durante o envelhecimento. Com o passar dos anos, a boca dos seres humanos passa por diversas transformações, e o esmalte dos dentes se torna mais fino e frágil, aumentando o risco de desgaste, fraturas e sensibilidade. Entretanto, mesmo com essa importância, o tema é subestimado e recebe pouca atenção nessa faixa etária. Segundo um médico dedicado ao cuidado da população idosa, a perda dentária está entre os problemas mais comuns no País e é ainda mais elevada entre os idosos: cerca de 60% deles apresentam edentulismo em pelo menos uma arcada.

Esse e outros problemas dentais causam diversos prejuízos à qualidade de vida durante o envelhecimento. Dentre eles, a nutrição é diretamente impactada, visto que, sem dentes adequados, as pessoas evitam alimentos duros, fibrosos ou que exigem mastigação, optando por dietas pastosas, pobres em nutrientes, fibras e proteínas.

Além da perda dentária, outro grande problema na saúde bucal durante o envelhecimento é a periodontite, uma inflamação crônica das gengivas e do osso de suporte dos dentes, causada principalmente por bactérias da placa. No idoso, ela progride mais rapidamente devido às mudanças imunológicas e ao acúmulo de fatores de risco. A periodontite gera inflamação sistêmica associada ao agravamento de doenças cardiovasculares, ao pior controle do diabetes e ao maior risco de complicações respiratórias. Trata-se de um processo silencioso que, se não tratado, pode acelerar a perda dentária e comprometer a saúde geral.

Cuidar da saúde bucal traz impactos positivos profundos: melhor nutrição, maior autoestima, redução do isolamento social, menor risco de inflamações crônicas e envelhecimento mais saudável e autônomo. Muitos problemas podem ser prevenidos ao longo da vida com uma higiene bucal diária rigorosa, baseada na escovação com cerdas macias após as refeições, no uso de fio dental ou de escovas interdentais e na limpeza da língua. Somam-se a esses cuidados as consultas regulares ao dentista, pelo menos a cada seis meses, e o uso de próteses bem adaptadas, quando necessário.

MARINO, Breno. No envelhecimento, perda dentária e inflamações gengivais podem impactar saúde e autoestima. Jornal da USP, São Paulo, 16 jun. 2026. Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/cuidados-com-a-saude-bucal-no-envelhecimento-sao-essenciais-para-garantir-qualidade-de-vida/. Acesso em: 30 set. 2026. (Adaptado.)

Questão 04

(Correta: C)

O texto trata das transformações da saúde bucal no envelhecimento e de suas repercussões sobre a saúde geral, articulando dados, relações de causa e recomendações. Com base nos sentidos construídos no texto e nas inferências que ele autoriza, registre (V), para verdadeiro, e (F), para falso.

(__)A adoção de dietas pastosas é apresentada como recurso recomendado para compensar a perda dentária e preservar a nutrição do idoso.

(__)Ao afirmar que o tema "é subestimado", o texto indica que a atenção dada à saúde bucal na velhice não corresponde à importância que o próprio texto lhe atribui.

(__)O qualificativo "silencioso", aplicado à periodontite, indica que a doença pode progredir sem manifestações evidentes, comprometendo a saúde sem ser percebida.

(__)Segundo o texto, a progressão mais rápida da periodontite no idoso decorre da maior concentração de bactérias da placa nessa faixa etária.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) V, V, F, F.
(B) V, F, V, F.
(C) F, V, V, F.
(D) F, V, F, V.

Questão 05

(Correta: C)

Alguns termos do texto exigem complementos introduzidos por preposição, e a combinação dessa preposição com o artigo pode, conforme o caso, resultar em crase. A análise requer identificar qual palavra rege o complemento e verificar se há, de fato, artigo feminino diante do termo seguinte.

Considerando a regência e o emprego do acento indicativo de crase na norma-padrão, conclui-se corretamente que:

(A) em "consultas regulares ao dentista", a preposição decorre da regência do adjetivo "regulares", e não do substantivo "consultas", ao qual o complemento se vincula.
(B) em "optando por dietas pastosas", a troca de "optando por" por "recorrendo" exigiria o acento grave, já que o verbo "recorrer" rege a preposição "a" nesse contexto.
(C) em "associada ao agravamento de doenças cardiovasculares", a contração decorre da regência de "associada", e trocar "agravamento" por "piora" exigiria o acento grave.
(D) em "após as refeições", a ausência do acento grave contraria a norma-padrão, pois a preposição "após" se funde ao artigo feminino que antecede o termo "refeições".

Sistema Único de Saúde e Saúde Bucal

Questão 06

(Correta: B)

O Sistema Único de Saúde organiza-se segundo princípios e diretrizes definidos em lei e estrutura suas ações e serviços em redes de atenção. Acerca desse modelo de organização, registre (V), para verdadeiro, e (F), para falso.

(__)A universalidade de acesso aos serviços de saúde alcança todos os níveis de assistência do sistema.

(__)A participação da comunidade se exerce por meio das comissões intergestores bipartite e tripartite.

(__)Os pontos de atenção de maior densidade tecnológica têm maior importância para os objetivos da rede.

(__)A organização das Redes de Atenção à Saúde pressupõe a articulação de serviços com diferentes densidades tecnológicas, mediante relações horizontais entre os pontos de atenção, sem hierarquia de importância entre eles.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) V, V, F, F.
(B) V, F, F, V.
(C) F, V, V, F.
(D) F, F, V, V.

Questão 07

(Correta: B)

Pela Política Nacional de Saúde Bucal, as ações de saúde bucal devem compor todas as redes de atenção à saúde e integrar as demais políticas de saúde, viabilizando intervenção sobre _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) agravos bucais prevalentes.
(B) fatores comuns de risco.
(C) hábitos individuais de higiene.
(D) riscos cariogênicos.

Questão 08

(Correta: A)

Os Centros de Especialidades Odontológicas ofertam cuidado ambulatorial especializado em saúde bucal no Sistema Único de Saúde. Sobre esses centros e sua posição na rede, analise as afirmativas a seguir.

I.O centro recebe os casos de maior complexidade encaminhados pela atenção primária, responsável pelo atendimento inicial do usuário.

II.A tipologia do centro é definida pelo número de cadeiras odontológicas, de três no menor porte a sete ou mais no maior porte.

III.A implantodontia e a ortodontia integram o elenco de atividades mínimas exigido do centro para a sua habilitação na rede.

É correto o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I, II e III.
(D) I, apenas.

Questão 09

(Correta: C)

No Sistema Único de Saúde, o percurso do usuário entre serviços de diferentes densidades tecnológicas depende de fluxos pactuados de encaminhamento e de retorno. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.Concluído o tratamento no serviço especializado, a contrarreferência devolve o usuário à atenção primária, que segue coordenando o seu cuidado.

PORQUE

II.A integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa no ponto de atenção para o qual o usuário foi referenciado.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
(C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(D) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

Questão 10

(Correta: C)

Um usuário residente fora da área de abrangência de uma Unidade Básica de Saúde chega à unidade, sem agendamento, com dor dentária intensa desde a noite anterior. Considerando os papéis da atenção primária e da atenção especializada, assinale a alternativa que descreve a conduta correta da equipe.

(A) Encaminhar o usuário ao serviço de atenção especializada, que responde pelo atendimento das urgências odontológicas da região.
(B) Registrar a demanda do usuário e inseri-lo na lista de espera da unidade, respeitando o critério cronológico de chegada.
(C) Acolher o usuário com escuta qualificada e classificação de risco e realizar na própria unidade o atendimento da urgência.
(D) Orientar o usuário a buscar a unidade de sua área de abrangência, responsável por acolhê-lo e classificar o seu risco.

Ética, Legislação Profissional e Biossegurança.

Questão 11

(Correta: A)

Um cirurgião-dentista que divide a clínica com outros profissionais enfrenta situações que envolvem seus deveres perante pacientes e colegas. Considerando o Código de Ética Odontológica, registre (V), para verdadeiro, e (F), para falso.

(__)O abandono do paciente por motivo justificável exige a conciliação dos honorários e a informação sobre a necessidade de continuidade do tratamento.

(__)A responsabilidade pelos atos praticados é transferida ao paciente quando o procedimento foi por ele solicitado e consentido após os esclarecimentos.

(__)Deixar de atender paciente que procure cuidados em caso de urgência, quando não haja outro cirurgião-dentista em condições de fazê-lo, é infração ética.

(__)A crítica a erro técnico-científico de colega ausente é admitida quando dirigida ao paciente atendido por ambos, para orientar a sequência do tratamento.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) V, F, V, F.
(B) F, V, F, V.
(C) F, F, V, V.
(D) V, V, F, F.

Questão 12

(Correta: C)

Na reabilitação protética, a documentação do caso envolve tanto o prontuário mantido no consultório quanto os registros que acompanham o material enviado para confecção da peça. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.O cirurgião-dentista deve encaminhar o material ao laboratório de prótese dentária devidamente acompanhado de ficha específica assinada.

PORQUE

II.O registro dos procedimentos técnico-laboratoriais efetuados, mantido em arquivo próprio, é dever ético do cirurgião-dentista que solicitou o trabalho.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
(C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

Questão 13

(Correta: D)

Após uma exodontia, o paciente pede ao cirurgião-dentista um documento que comprove, perante o empregador, a necessidade de se ausentar do trabalho durante a recuperação. Considerando a Lei Federal nº 5.081/1966, assinale a alternativa que descreve corretamente a conduta do profissional.

(A) Condicionar o atestado à perícia odontolegal em sede administrativa, pois a lei exige esse exame prévio para que o documento sirva à justificação de faltas ao emprego.
(B) Redigir atestado que abranja também a hipertensão relatada na anamnese, pois a lei confere ao cirurgião-dentista a atestação de estados mórbidos sem vínculo com sua área.
(C) Fornecer declaração de comparecimento, pois a lei reserva o atestado odontológico às finalidades periciais, ficando com o médico a justificação de faltas.
(D) Emitir atestado, já que lhe compete "atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive, para justificação de faltas ao emprego".

Questão 14

(Correta: C)

As precauções-padrão são medidas de prevenção utilizadas _____ diagnóstico confirmado ou presumido de doença infecciosa transmissível no paciente, e o material perfurocortante deve ser desprezado, _____, em recipiente com tampa e resistente a perfuração.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

(A) na vigência de - quando contaminado por sangue.
(B) independentemente de - quando contaminado por sangue.
(C) independentemente de - mesmo que estéril.
(D) na vigência de - mesmo que estéril.

Questão 15

(Correta: C)

Na rotina da clínica, a equipe coleta dados de saúde na anamnese, planeja procedimentos com o paciente e, às vezes, precisa decidir se pode revelar informações obtidas no atendimento. Sobre essas situações, analise as afirmativas a seguir.

I.Os dados de saúde coletados na anamnese são dados pessoais sensíveis e podem ser tratados, sem consentimento do titular, para a tutela da saúde em procedimento realizado por profissionais de saúde.

II.A menção ao tratamento realizado, na cobrança judicial de honorários profissionais, configura quebra do sigilo profissional quando não houver autorização expressa do paciente ou de seu responsável.

III.Iniciar procedimento ou tratamento odontológico sem o consentimento prévio do paciente ou de seu responsável legal constitui infração ética, ressalvados os casos de urgência ou emergência.

É correto o que se afirma em:

(A) I, apenas.
(B) I, II e III.
(C) I e III, apenas.
(D) III, apenas.

Fundamentos Clínicos e Urgências Odontológicas

Questão 16

(Correta: C)

Na urgência odontológica, a distinção entre as lesões de origem periodontal e as de origem endodôntica exige a integração dos achados clínicos com os testes diagnósticos, pois os dois quadros podem cursar com dor e tumefação semelhantes. Sobre esses recursos diagnósticos, analise as afirmativas a seguir.

I.Em dente com tumefação associada a bolsa periodontal profunda localizada, a resposta positiva ao teste térmico ao frio favorece o diagnóstico de abscesso periodontal em relação ao de abscesso periapical agudo.

II.O teste elétrico pulpar permite estimar o grau de inflamação da polpa pela intensidade da corrente necessária para desencadear a resposta do paciente.

III.A sensibilidade do dente à percussão pode estar presente tanto na doença periodontal quanto na inflamação periapical, e por isso o achado isolado não define a origem do quadro.

É correto o que se afirma em:

(A) I, apenas.
(B) I, II e III.
(C) I e III, apenas.
(D) III, apenas.

Questão 17

(Correta: B)

O planejamento do atendimento odontológico de pacientes em uso de anticoagulante oral envolve decisões sobre a manutenção do fármaco, as medidas hemostáticas locais e a prescrição para o período pós-operatório. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.No planejamento da exodontia de paciente em uso contínuo de varfarina, com razão normalizada internacional estável na faixa terapêutica, o ibuprofeno é o analgésico de primeira escolha para o pós-operatório.

PORQUE

II.Os anti-inflamatórios não esteroides reduzem a agregação plaquetária e podem agravar eventos hemorrágicos.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(B) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(C) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
(D) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

Questão 18

(Correta: C)

Na avaliação sistêmica de pacientes adultos que serão submetidos a procedimentos odontológicos eletivos sob anestesia local, o cirurgião-dentista adota a Classificação do Estado Físico da American Society of Anesthesiologists (ASA) a partir dos dados obtidos na anamnese. Associe cada classe da Coluna I ao paciente correspondente da Coluna II.

Coluna I

1.ASA I.

2.ASA II.

3.ASA III.

4.ASA IV.

Coluna II

(__)Paciente com infarto agudo do miocárdio ocorrido há seis semanas.

(__)Paciente hipertenso, com pressão arterial bem controlada por medicação e sem limitação funcional.

(__)Paciente com infarto agudo do miocárdio ocorrido há oito meses, em acompanhamento cardiológico.

(__)Paciente não fumante, sem doença sistêmica e com consumo mínimo de bebida alcoólica.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo.

(A) 4, 1, 3, 2.
(B) 3, 2, 4, 1.
(C) 4, 2, 3, 1.
(D) 4, 3, 2, 1.

Questão 19

(Correta: D)

Adulto imunocompetente, sem comorbidades, procura atendimento de urgência com dor espontânea, intensa e prolongada após estímulo térmico em molar com cárie profunda, sem tumefação, febre ou linfadenopatia, e os testes confirmam pulpite irreversível sintomática. Considerando as recomendações para o manejo desse quadro, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.

(A) Analgésico e reavaliação após uma semana, sem intervenção no dente, por se tratar de inflamação pulpar passível de regressão.
(B) Antibiótico sistêmico por alguns dias antes da intervenção, para reduzir a inflamação pulpar e favorecer o efeito da anestesia local.
(C) Remoção do tecido pulpar sob anestesia local, associada a antibiótico sistêmico para prevenir a evolução para abscesso periapical.
(D) Intervenção no dente para remoção do tecido pulpar inflamado, sob anestesia local, com analgésico e sem antibiótico sistêmico.

Questão 20

(Correta: C)

Durante um atendimento em consultório, paciente adulto apresenta colapso súbito na cadeira odontológica, e o cirurgião-dentista, após confirmar a segurança do local, inicia o suporte básico de vida conforme o algoritmo destinado a profissionais de saúde. Considere as condutas listadas a seguir.

(1)Iniciar ciclos de 30 compressões torácicas e 2 ventilações.

(2)Verificar a responsividade, chamando e tocando o paciente.

(3)Verificar a respiração e o pulso central, simultaneamente, por até 10 segundos.

(4)Pedir ajuda, acionar o serviço de emergência e solicitar o desfibrilador externo automático.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta em que essas condutas são executadas.

(A) 3, 2, 4, 1.
(B) 4, 2, 3, 1.
(C) 2, 4, 3, 1.
(D) 2, 3, 1, 4.

Endodontia

Questão 21

(Correta: B)

Na cirurgia parendodôntica com técnica microcirúrgica, a apicectomia antecede o preparo e a obturação retrógrados da extremidade radicular. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.Na apicectomia microcirúrgica, recomenda-se ressecar ao menos 3 mm da extremidade radicular.

PORQUE

II.Essa extensão de ressecção elimina cerca de 98% das ramificações apicais e 93% dos canais laterais presentes no ápice.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
(C) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
(D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

Questão 22

(Correta: C)

Incisivo com resposta positiva ao frio apresenta, em radiografias com duas angulações horizontais, radiolucidez ovalada de contorno regular no terço médio, que permanece centrada no canal nas duas tomadas. Assinale a alternativa que interpreta corretamente o achado.

(A) Reabsorção externa, pois o defeito se sobrepõe ao canal nas duas tomadas e o contorno original do canal permanece visível através da lesão.
(B) Reabsorção inflamatória externa, pois o contorno regular e a posição estável nas duas tomadas indicam origem no periodonto.

(C) Reabsorção interna, pois o defeito se mantém contíguo ao canal em qualquer angulação, sem que o contorno do canal cruze a lesão.

(D) Reabsorção por substituição, pois a radiolucidez contígua ao canal revela anquilose com desaparecimento do espaço do ligamento periodontal.

Questão 23

(Correta: A)

No atendimento de urgência endodôntica, a conduta depende do diagnóstico pulpar e periapical e da presença de sinais de comprometimento sistêmico. Acerca desse tema, registre (V), para verdadeiro, e (F), para falso.

(__)No abscesso apical agudo com edema localizado e flutuante, a incisão para drenagem integra a conduta de urgência.

(__)Na pulpite irreversível sintomática, a remoção do tecido pulpar por pulpotomia ou pulpectomia promove o alívio da dor.

(__)Na periodontite apical sintomática, o antibiótico sistêmico associado ao debridamento do canal reduz a dor pós-operatória.

(__)Na pulpite reversível, a pulpectomia imediata é a conduta de urgência indicada para controlar a dor provocada pelo frio.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) V, V, F, F.
(B) F, V, F, V.
(C) F, F, V, V.
(D) V, F, V, F.

Questão 24

(Correta: B)

A determinação do comprimento de trabalho pode recorrer a diferentes métodos, cada um com fundamento e limitação próprios. Associe cada método de odontometria da Coluna I à sua descrição na Coluna II.

Coluna I

1.Método de Bregman.

2.Método de Ingle.

3.Localizador apical eletrônico.

4.Sensibilidade tátil.

Coluna II

(__)Identifica o forame pela variação da impedância medida entre a lima no canal e o clipe metálico preso ao lábio.

(__)Calcula o comprimento real por regra de três entre a medida real e a radiográfica de um instrumento inserido no canal.

(__)Baseia-se na resistência percebida pelos dedos ao avanço da lima na constrição, recurso de baixa confiabilidade.

(__)Subtrai três milímetros da medida na radiografia inicial, radiografa a lima e corrige pela distância até o ápice.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo.

(A) 3, 1, 2, 4.
(B) 3, 1, 4, 2.
(C) 2, 4, 1, 3.
(D) 1, 2, 4, 3.

Questão 25

(Correta: A)

Em canal atresiado e curvo de molar com necrose pulpar, o profissional alarga os terços cervical e médio antes de explorar e instrumentar o terço apical. Assinale a alternativa que fundamenta corretamente essa sequência de preparo.

(A) A remoção precoce das interferências cervicais reduz a extrusão de detritos pelo forame e amplia a ação da solução irrigadora.

(B) A sequência mantém o conteúdo séptico do terço cervical intacto até o final, evitando que ele seja deslocado para o ápice.

(C) O alargamento cervical prévio dispensa a odontometria, pois o comprimento de trabalho deixa de variar durante o preparo apical.

(D) A ampliação cervical inicial acentua a curvatura efetiva do canal e favorece o contato da lima com a parede externa.

Questão 26

(Correta: D)

A terminologia diagnóstica em Endodontia integra a queixa do paciente, os testes clínicos e o exame radiográfico. Sobre os diagnósticos periapicais, analise as afirmativas a seguir.

I.A periodontite apical assintomática é a inflamação e destruição do periodonto apical de origem pulpar, com área radiolúcida e sem sintomas clínicos.

II.O abscesso apical crônico tem início gradual, pouco ou nenhum desconforto e drenagem intermitente de pus por uma fístula associada ao dente.

III.A osteíte condensante é uma lesão radiolúcida difusa que representa reação óssea localizada a estímulo inflamatório de baixa intensidade.

É correto o que se afirma em:

(A) II, apenas.
(B) I, II e III.

(C) I, apenas.
(D) I e II, apenas.

Questão 27

(Correta: C)

Em dente com pulpite irreversível tratado por biopulpectomia, em que a polpa radicular está inflamada, o objetivo biológico central do preparo e da obturação do canal radicular consiste em _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) neutralizar o conteúdo séptico do canal.
(B) induzir a formação de barreira mineralizada apical.
(C) prevenir a infecção do sistema de canais.
(D) eliminar a infecção já instalada.

Questão 28

(Correta: C)

Na abertura coronária de um molar inferior, a sequência operatória garante acesso direto aos canais e preserva as paredes da câmara pulpar. Considere as etapas a seguir, apresentadas fora da ordem de execução.

(1)Remoção do teto da câmara pulpar com broca esférica em movimentos de dentro para fora.

(2)Penetração inicial no ponto de eleição, situado no centro da fossa principal mesial da face oclusal.

(3)Desgaste compensatório nas entradas dos canais com broca de ponta inativa.

(4)Trepanação em direção à câmara pulpar até a sensação de queda no vazio.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta de execução dessas etapas.

(A) 2, 4, 3, 1.
(B) 4, 1, 2, 3.
(C) 2, 4, 1, 3.
(D) 4, 2, 3, 1.

Questão 29

(Correta: A)

A exploração do assoalho da câmara pulpar do primeiro molar superior exige conhecimento das variações anatômicas de suas raízes vestibulares. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.No primeiro molar superior, é frequente um segundo canal mesiovestibular, cuja entrada se situa por palatino da entrada do canal mesiovestibular principal.

PORQUE

II.A raiz mesiovestibular do primeiro molar superior apresenta secção transversal arredondada, com o maior diâmetro no sentido mesiodistal.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
(C) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
(D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

Questão 30

(Correta: A)

Em dentes com periodontite apical, a composição da microbiota difere entre as infecções primária, persistente e extrarradicular. Acerca desse tema, registre (V), para verdadeiro, e (F), para falso.

(__)Enterococcus faecalis, coco gram-positivo anaeróbio facultativo, é frequente em canais já tratados com lesão persistente.

(__)A infecção primária é composta em sua maioria por bactérias facultativas gram-positivas, com baixa participação de anaeróbios.

(__)A actinomicose apical, forma de infecção extrarradicular, envolve espécies de Actinomyces e Propionibacterium propionicum.

(__)O lipopolissacarídeo, endotoxina liberada na lise bacteriana, integra a parede celular das bactérias gram-positivas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima,

(A) V, F, V, F.
(B) F, V, F, V.
(C) V, F, F, V.
(D) F, V, V, F.

Questão 31

(Correta: D)

Os sistemas de instrumentação manual e mecanizada diferem quanto à liga metálica, à cinemática e aos mecanismos de fratura dos instrumentos. Acerca desse tema, registre (V), para verdadeiro, e (F), para falso.

(__)A superelasticidade da liga de níquel-titânio permite acompanhar curvaturas com menor desvio que limas de aço de mesmo calibre.

(__)A fratura por fadiga cíclica decorre do travamento da ponta do instrumento na dentina enquanto o motor continua girando a haste.

(__)As limas tipo K de aço inoxidável, pela maior rigidez, reduzem o risco de degrau em canais curvos quando usadas sem pré-curvatura.

(__)No movimento reciprocante, o ângulo no sentido de corte supera o de liberação, o que faz o instrumento avançar no canal.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) V, V, F, F.
(B) F, F, V, V.
(C) F, V, V, F.
(D) V, F, F, V.

Questão 32

(Correta: B)

Paciente relata dor surda, difusa e de difícil localização em molar com cárie extensa, que persiste embora o teste elétrico já não provoque resposta nítida. Considerando as fibras nervosas pulpares envolvidas nesse quadro, assinale a alternativa correta.

(A) As fibras C, de condução rápida, respondem pela dor aguda e bem localizada que o estímulo frio desencadeia na dentina exposta.
(B) As fibras C, amielínicas e situadas no centro da polpa, conduzem dor lenta e resistem melhor à hipóxia do tecido pulpar inflamado.
(C) As fibras C, mielinizadas e concentradas junto à camada odontoblástica, respondem de imediato ao movimento do fluido nos túbulos dentinários.
(D) As fibras A-delta, localizadas sobretudo no centro da polpa, conduzem dor lenta e mantêm sua excitabilidade mesmo no tecido pulpar sob intensa hipóxia.

Questão 33

(Correta: A)

Em incisivo com necrose pulpar e rizogênese incompleta, a segunda sessão do procedimento endodôntico regenerador ocorre após a desinfecção com medicação intracanal. Considere as etapas a seguir, apresentadas fora da ordem de execução.

(1)Indução de sangramento com lima pré-curvada levada além do forame apical.

(2)Aplicação de cimento de silicato de cálcio sobre a matriz e o coágulo.

(3)Irrigação suave e abundante do canal com ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) a 17%.

(4)Colocação de matriz reabsorvível de colágeno sobre o coágulo formado.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta de execução dessas etapas.

(A) 3, 1, 4, 2.
(B) 3, 1, 2, 4.
(C) 1, 4, 3, 2.
(D) 1, 3, 2, 4.

Questão 34

(Correta: D)

Antes da obturação pela técnica da condensação lateral, o cone principal de guta-percha é selecionado e testado no canal já preparado. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.O cone principal adequado alcança o comprimento de trabalho e desliza para fora do canal sem resistência à tração, o que indica boa adaptação apical.

PORQUE

II.O travamento do cone principal no comprimento de trabalho favorece o selamento apical e reduz o risco de extravasamento do material obturador.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
(C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

Questão 35

(Correta: D)

Após o tratamento de canal de dente com periodontite apical, a lesão diminui sem desaparecer. Nesse caso, o controle clínico e radiográfico segue até a resolução ou por, no mínimo, _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) dezoito meses.
(B) um ano.
(C) dois anos.
(D) quatro anos.

Questão 36

(Correta: A)

A classificação de Simon, Glick e Frank orienta o diagnóstico e a sequência de tratamento das lesões que envolvem a polpa e o periodonto. Associe cada categoria da Coluna I ao quadro clínico da Coluna II.

Coluna I

1.Lesão endodôntica primária.

2.Lesão periodontal primária.

3.Lesão endodôntica primária com envolvimento periodontal secundário.

4.Lesão combinada verdadeira.

Coluna II

(__)Bolsas generalizadas com cálculo e perda óssea em vários dentes, com resposta normal da polpa aos testes de sensibilidade.

(__)Duas alterações de origem independente, uma

pulpar e outra marginal, que avançam ao longo da raiz até coalescerem.

(__)Trajeto fistuloso estreito drenando pelo sulco em dente com necrose, que cicatriza após o tratamento do canal.

(__)Drenagem pelo sulco de longa duração em dente com necrose, com biofilme e cálculo depositados no trajeto sobre a raiz.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo.

(A) 2, 4, 1, 3.
(B) 4, 2, 3, 1.
(C) 1, 3, 2, 4.
(D) 2, 3, 1, 4.

Questão 37

(Correta: C)

Durante o preparo químico-mecânico, falhas de técnica podem gerar acidentes com prognóstico e conduta distintos. Associe cada acidente da Coluna I à sua descrição na Coluna II.

Coluna I

1.Degrau.

2.Transporte apical.

3.Perfuração em rasgo.

4.Extravasamento de hipoclorito de sódio.

Coluna II

(__)Dor intensa imediata, edema de instalação rápida e equimose após a solução irrigadora alcançar os tecidos periapicais.

(__)Plataforma artificial criada na parede do canal, que impede o instrumento de alcançar o comprimento de trabalho.

(__)Comunicação lateral na parede voltada para a furca da raiz mesial de molar inferior, por desgaste excessivo na curvatura.

(__)Desvio da trajetória original no segmento final, com alargamento elíptico do forame por lima rígida em canal curvo.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo.

(A) 1, 2, 4, 3.
(B) 2, 1, 3, 4.
(C) 4, 1, 3, 2.
(D) 4, 2, 1, 3.

Questão 38

(Correta: D)

Em pré-molar inferior hígido e responsivo ao frio, radiolucidez arredondada sobre o ápice, com lâmina dura íntegra, muda de posição ao se alterar a angulação horizontal. A imagem corresponde ao _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) cisto radicular.
(B) abscesso apical crônico.
(C) granuloma.
(D) forame mentual.

Questão 39

(Correta: C)

No preparo de molar com necrose pulpar, a escolha das soluções irrigadoras considera dissolução tecidual, ação antimicrobiana e remoção da lama dentinária. Sobre essas soluções, analise as afirmativas a seguir.

I.O hipoclorito de sódio dissolve tecido orgânico vital e necrosado, ao degradar proteínas em aminoácidos pela ação do cloro livre.

II.A clorexidina a 2% dissolve tecido pulpar necrosado de forma equivalente ao hipoclorito e soma a isso ação antimicrobiana residual.

III.O ácido etilenodiaminotetracético a 17% atua como quelante e remove a porção inorgânica da lama dentinária formada na instrumentação.

É correto o que se afirma em:

(A) I, apenas.
(B) III, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) I, II e III.

Questão 40

(Correta: B)

Paciente adulto sofre intrusão de 5 mm do incisivo central superior, com rizogênese completa e sem fratura associada. Nesse caso, assinale a alternativa que descreve corretamente a conduta.

(A) Reposicionar ortodonticamente sem esplintagem e realizar pulpectomia com obturação definitiva na sessão do atendimento inicial.
(B) Reposicionar cirúrgica ou ortodonticamente, conter com esplintagem flexível por 4 semanas e iniciar a endodontia em cerca de 2 semanas.
(C) Reposicionar cirurgicamente, conter com esplintagem rígida por 8 semanas e aguardar sinais de necrose pulpar antes de intervir no canal.
(D) Aguardar a reerupção espontânea por até 8 semanas, com controle clínico e radiográfico, e indicar a endodontia diante de sinais de necrose pulpar.