PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2026

CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALIZADO - PRÓTESE DENTÁRIA

ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES A SEGUIR.

- Verifique se o Caderno de Questões está completo e se o cargo indicado corresponde à sua inscrição. Havendo qualquer irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- A prova tem duração de 3 horas e 30 minutos, incluído o tempo destinado ao preenchimento da Folha de Respostas. O tempo mínimo de permanência em sala é de 1 hora e 45 minutos.
- Este caderno contém 40 questões objetivas. Utilize-o apenas como rascunho. As respostas somente serão consideradas válidas quando assinaladas na Folha de Respostas.
- Na Folha de Respostas, marque apenas uma alternativa por questão, utilizando caneta esferográfica azul ou preta. Questões com dupla marcação, rasuradas ou em branco serão anuladas.
- Não haverá substituição do Caderno de Questões nem da Folha de Respostas por erro do candidato.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos, após a assinatura da ata.
- Não se esqueça de assinar e registrar sua impressão digital na Folha de Respostas a ser entregue ao fiscal no final da prova.
- Somente será permitido ao candidato levar consigo o Caderno de Questões nos 30 (trinta) minutos que antecedem o horário oficial de término da prova. Caso o candidato deixe a sala antes desse tempo, deverá entregar ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, esta devidamente assinada e com a impressão digital registrada.
- O candidato que deixar a sala antes dos 30 minutos finais do tempo de duração da prova e não devolver o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, terá sua prova anulada.

✂----------

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2026

O espaço abaixo é destinado à anotação das respostas. Este canhoto poderá ser levado consigo. Solicite ao fiscal que o destaque.
A divulgação dos editais de resultado está prevista para quarta-feira a partir das 18h nos sites: www.ibamsp-concursos.org.br/ e dom.maua.sp.gov.br

01-	02-	03-	04-	05-	06-	07-	08-	09-	10-
11-	12-	13-	14-	15-	16-	17-	18-	19-	20-
21-	22-	23-	24-	25-	26-	27-	28-	29-	30-
31-	32-	33-	34-	35-	36-	37-	38-	39-	40-

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 3.

A alfabetização em saúde bucal, em sua essência, refere-se à capacidade do indivíduo de obter, processar e compreender informações relevantes sobre saúde bucal, de modo a tomar decisões informadas e adequadas. No Brasil, estudos indicam um baixo nível de alfabetização em saúde, frequentemente corroborado por uma comunicação deficiente entre profissionais e pacientes. Essa lacuna na comunicação gera baixa adesão ao tratamento e insatisfação com os resultados, revelando que a falta de alfabetização pode dificultar a tomada de decisões compartilhadas, um aspecto importante para o sucesso no tratamento de quaisquer condições de saúde.

Doenças bucais não transmissíveis, como cárie dentária, gengivite e doença periodontal, são, em grande parte, preveníveis. No entanto, o acesso limitado à informação sobre saúde bucal ainda é uma realidade para muitos. A falta de conhecimento pode não apenas facilitar a incidência de tais doenças, mas também agravar condições já existentes. Indivíduos com conhecimento limitado tendem a buscar atendimento odontológico apenas em condições emergenciais, frequentemente enfrentando problemas dentários que poderiam ter sido evitados com intervenções precoces.

Esse comportamento não só impacta a frequência dos atendimentos preventivos, mas também resulta em custos mais elevados para os serviços de saúde. O tratamento em estágios avançados frequentemente requer intervenções cirúrgicas e protéticas que são financeiramente onerosas. Além disso, ao lidarem com problemas bucais estabelecidos, muitos pacientes experienciam um aumento da ansiedade e do medo em relação ao tratamento odontológico. Essa situação gera estresse e, consequentemente, aumenta as chances de insucesso no tratamento, uma vez que a compreensão e a adesão às recomendações no momento do atendimento podem ser comprometidas.

Para que a comunicação e a interação entre profissionais de saúde e pacientes sejam efetivas, é imperativo que os profissionais conheçam o nível de alfabetização de seus pacientes. Essa compreensão permitirá a adaptação das abordagens educacionais e informativas, facilitando o processo de empoderamento do paciente, promovendo uma maior adesão e melhores resultados em saúde.

OLIVEIRA, Fernanda Maria Machado Pereira Cabral de et al. Alfabetização em saúde como propulsor da autonomia para o autocuidado. Jornal da USP, São Paulo, 8 ago. 2025. Disponível em: https://jornal.usp.br/artigos/alfabetizacao-em-saude-como-propulsor-da-autonomia-para-o-autocuidado/. Acesso em: 30 set. 2026. (Adaptado.)

Questão 01

(Correta: B)

O texto examina de que modo o nível de alfabetização em saúde bucal interfere na relação entre pacientes e profissionais, encadeando um diagnóstico, as consequências dele decorrentes e uma recomendação final. A leitura adequada exige distinguir o que o texto apresenta como causa, o que apresenta como efeito e o que propõe como encaminhamento.

Considerando a progressão argumentativa do texto, assinale a alternativa correta.

(A) Os custos elevados mencionados no texto resultam da preferência dos pacientes por intervenções cirúrgicas e protéticas em detrimento dos atendimentos de prevenção.

(B) A responsabilidade pela qualidade da comunicação recai também sobre o profissional, pois conhecer o nível de alfabetização do paciente é condição para orientá-lo bem.

(C) A ansiedade diante do tratamento é apontada como origem da baixa alfabetização em saúde bucal, uma vez que o medo afasta o paciente das informações sobre prevenção.

(D) As doenças bucais não transmissíveis são apresentadas como decorrência direta da falta de informação, razão pela qual seriam evitáveis por meio de ações educativas.

Questão 02

(Correta: B)

Na construção da coesão do texto, o autor emprega expressões que retomam porções anteriores, muitas vezes condensando-as em um termo de valor resumitivo. A identificação do referente exige considerar o parágrafo em que cada expressão aparece e o conteúdo que ela efetivamente recupera.

Associe as expressões transcritas do texto Coluna 1 aos conteúdos que elas retomam Coluna 2.

Coluna 1

1."Essa lacuna" (1º parágrafo).

2."tais doenças" (2º parágrafo).

3."Esse comportamento" (3º parágrafo).

4."Essa situação" (3º parágrafo).

Coluna 2

(__)A procura por atendimento odontológico restrita a condições emergenciais.

(__)O aumento da ansiedade e do medo em relação ao tratamento odontológico.

(__)A cárie dentária, a gengivite e a doença periodontal, em grande parte preveníveis.

(__)A comunicação deficiente entre profissionais de saúde e pacientes.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

(A) 1, 4, 2, 3.

(B) 3, 4, 2, 1.
(C) 4, 3, 2, 1.
(D) 3, 1, 2, 4.

Questão 03

(Correta: B)

Ao reelaborar informações do texto para um relatório sobre adesão ao tratamento odontológico, um profissional produziu versões em que a ordem dos termos e a estrutura das orações foram alteradas, o que afeta diretamente as relações de concordância entre sujeito e verbo.

Considerando as regras de concordância da norma-padrão, assinale a alternativa em que a reescrita está correta.

(A) Devem haver, entre os pacientes com conhecimento limitado sobre saúde bucal, aqueles que adiam a ida ao dentista até as situações emergenciais.
(B) No tratamento em estágios avançados, requerem-se, com frequência, intervenções cirúrgicas e protéticas que se mostram financeiramente onerosas.
(C) Para o sucesso do tratamento odontológico, é necessário que se conheça, desde a primeira consulta, os níveis de alfabetização de cada paciente.
(D) O aumento da ansiedade e do medo diante dos tratamentos, comum entre pacientes com problemas estabelecidos, comprometem a adesão às orientações.

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 4 a 5.

A saúde bucal é uma área de discussão fundamental durante o envelhecimento. Com o passar dos anos, a boca dos seres humanos passa por diversas transformações, e o esmalte dos dentes se torna mais fino e frágil, aumentando o risco de desgaste, fraturas e sensibilidade. Entretanto, mesmo com essa importância, o tema é subestimado e recebe pouca atenção nessa faixa etária. Segundo um médico dedicado ao cuidado da população idosa, a perda dentária está entre os problemas mais comuns no País e é ainda mais elevada entre os idosos: cerca de 60% deles apresentam edentulismo em pelo menos uma arcada.

Esse e outros problemas dentais causam diversos prejuízos à qualidade de vida durante o envelhecimento. Dentre eles, a nutrição é diretamente impactada, visto que, sem dentes adequados, as pessoas evitam alimentos duros, fibrosos ou que exigem mastigação, optando por dietas pastosas, pobres em nutrientes, fibras e proteínas.

Além da perda dentária, outro grande problema na saúde bucal durante o envelhecimento é a periodontite, uma inflamação crônica das gengivas e do osso de suporte dos dentes, causada principalmente por bactérias da placa. No idoso, ela progride mais rapidamente devido às mudanças imunológicas e ao acúmulo de fatores de risco. A periodontite gera inflamação sistêmica associada ao agravamento de doenças cardiovasculares, ao pior controle do diabetes e ao maior risco de complicações respiratórias. Trata-se de um processo silencioso que, se não tratado, pode acelerar a perda dentária e comprometer a saúde geral.

Cuidar da saúde bucal traz impactos positivos profundos: melhor nutrição, maior autoestima, redução do isolamento social, menor risco de inflamações crônicas e envelhecimento mais saudável e autônomo. Muitos problemas podem ser prevenidos ao longo da vida com uma higiene bucal diária rigorosa, baseada na escovação com cerdas macias após as refeições, no uso de fio dental ou de escovas interdentais e na limpeza da língua. Somam-se a esses cuidados as consultas regulares ao dentista, pelo menos a cada seis meses, e o uso de próteses bem adaptadas, quando necessário.

MARINO, Breno. No envelhecimento, perda dentária e inflamações gengivais podem impactar saúde e autoestima. Jornal da USP, São Paulo, 16 jun. 2026. Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/cuidados-com-a-saude-bucal-no-envelhecimento-sao-essenciais-para-garantir-qualidade-de-vida/. Acesso em: 30 set. 2026. (Adaptado.)

Questão 04

(Correta: A)

Alguns termos do texto exigem complementos introduzidos por preposição, e a combinação dessa preposição com o artigo pode, conforme o caso, resultar em crase. A análise requer identificar qual palavra rege o complemento e verificar se há, de fato, artigo feminino diante do termo seguinte.

Considerando a regência e o emprego do acento indicativo de crase na norma-padrão, conclui-se corretamente que:

(A) em "associada ao agravamento de doenças cardiovasculares", a contração decorre da regência de "associada", e trocar "agravamento" por "piora" exigiria o acento grave.
(B) em "optando por dietas pastosas", a troca de "optando por" por "recorrendo" exigiria o acento grave, já que o verbo "recorrer" rege a preposição "a" nesse contexto.
(C) em "consultas regulares ao dentista", a preposição decorre da regência do adjetivo "regulares", e não do substantivo "consultas", ao qual o complemento se vincula.
(D) em "após as refeições", a ausência do acento grave contraria a norma-padrão, pois a preposição "após" se funde ao artigo feminino que antecede o termo "refeições".

Questão 05

(Correta: C)

O texto trata das transformações da saúde bucal no

envelhecimento e de suas repercussões sobre a saúde geral, articulando dados, relações de causa e recomendações. Com base nos sentidos construídos no texto e nas inferências que ele autoriza, registre (V), para verdadeiro, e (F), para falso.

(__)A adoção de dietas pastosas é apresentada como recurso recomendado para compensar a perda dentária e preservar a nutrição do idoso.

(__)Ao afirmar que o tema "é subestimado", o texto indica que a atenção dada à saúde bucal na velhice não corresponde à importância que o próprio texto lhe atribui.

(__)O qualificativo "silencioso", aplicado à periodontite, indica que a doença pode progredir sem manifestações evidentes, comprometendo a saúde sem ser percebida.

(__)Segundo o texto, a progressão mais rápida da periodontite no idoso decorre da maior concentração de bactérias da placa nessa faixa etária.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) V, V, F, F.
(B) F, V, F, V.
(C) F, V, V, F.
(D) V, F, V, F.

Sistema Único de Saúde e Saúde Bucal

Questão 06

(Correta: B)

Pela Política Nacional de Saúde Bucal, as ações de saúde bucal devem compor todas as redes de atenção à saúde e integrar as demais políticas de saúde, viabilizando intervenção sobre _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) agravos bucais prevalentes.
(B) fatores comuns de risco.
(C) riscos cariogênicos.
(D) hábitos individuais de higiene.

Questão 07

(Correta: A)

Um usuário residente fora da área de abrangência de uma Unidade Básica de Saúde chega à unidade, sem agendamento, com dor dentária intensa desde a noite anterior. Considerando os papéis da atenção primária e da atenção especializada, assinale a alternativa que descreve a conduta correta da equipe.

(A) Acolher o usuário com escuta qualificada e classificação de risco e realizar na própria unidade o atendimento da urgência.
(B) Encaminhar o usuário ao serviço de atenção especializada, que responde pelo atendimento das urgências odontológicas da região.
(C) Orientar o usuário a buscar a unidade de sua área de abrangência, responsável por acolhê-lo e classificar o seu risco.
(D) Registrar a demanda do usuário e inseri-lo na lista de espera da unidade, respeitando o critério cronológico de chegada.

Questão 08

(Correta: A)

O Sistema Único de Saúde organiza-se segundo princípios e diretrizes definidos em lei e estrutura suas ações e serviços em redes de atenção. Acerca desse modelo de organização, registre (V), para verdadeiro, e (F), para falso.

(__)A universalidade de acesso aos serviços de saúde alcança todos os níveis de assistência do sistema.

(__)A participação da comunidade se exerce por meio das comissões intergestores bipartite e tripartite.

(__)Os pontos de atenção de maior densidade tecnológica têm maior importância para os objetivos da rede.

(__)A organização das Redes de Atenção à Saúde pressupõe a articulação de serviços com diferentes densidades tecnológicas, mediante relações horizontais entre os pontos de atenção, sem hierarquia de importância entre eles.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) V, F, F, V.
(B) V, V, F, F.
(C) F, V, V, F.
(D) F, F, V, V.

Questão 09

(Correta: B)

Os Centros de Especialidades Odontológicas ofertam cuidado ambulatorial especializado em saúde bucal no Sistema Único de Saúde. Sobre esses centros e sua posição na rede, analise as afirmativas a seguir.

I.O centro recebe os casos de maior complexidade encaminhados pela atenção primária, responsável pelo atendimento inicial do usuário.

II.A tipologia do centro é definida pelo número de cadeiras odontológicas, de três no menor porte a sete ou mais no maior porte.

III.A implantodontia e a ortodontia integram o elenco de atividades mínimas exigido do centro para a sua habilitação na rede.

É correto o que se afirma em:

(A) I, II e III.
(B) I e II, apenas.
(C) I, apenas.

(D) II, apenas.

Questão 10

(Correta: B)

No Sistema Único de Saúde, o percurso do usuário entre serviços de diferentes densidades tecnológicas depende de fluxos pactuados de encaminhamento e de retorno. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.Concluído o tratamento no serviço especializado, a contrarreferência devolve o usuário à atenção primária, que segue coordenando o seu cuidado.

PORQUE

II.A integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa no ponto de atenção para o qual o usuário foi referenciado.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
(B) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(C) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(D) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

Ética, Legislação Profissional e Biossegurança.

Questão 11

(Correta: D)

Na rotina da clínica, a equipe coleta dados de saúde na anamnese, planeja procedimentos com o paciente e, às vezes, precisa decidir se pode revelar informações obtidas no atendimento. Sobre essas situações, analise as afirmativas a seguir.

I.Os dados de saúde coletados na anamnese são dados pessoais sensíveis e podem ser tratados, sem consentimento do titular, para a tutela da saúde em procedimento realizado por profissionais de saúde.

II.A menção ao tratamento realizado, na cobrança judicial de honorários profissionais, configura quebra do sigilo profissional quando não houver autorização expressa do paciente ou de seu responsável.

III.Iniciar procedimento ou tratamento odontológico sem o consentimento prévio do paciente ou de seu responsável legal constitui infração ética, ressalvados os casos de urgência ou emergência.

É correto o que se afirma em:

(A) I, II e III.
(B) III, apenas.
(C) I, apenas.
(D) I e III, apenas.

Questão 12

(Correta: D)

Na reabilitação protética, a documentação do caso envolve tanto o prontuário mantido no consultório quanto os registros que acompanham o material enviado para confecção da peça. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.O cirurgião-dentista deve encaminhar o material ao laboratório de prótese dentária devidamente acompanhado de ficha específica assinada.

PORQUE

II.O registro dos procedimentos técnico-laboratoriais efetuados, mantido em arquivo próprio, é dever ético do cirurgião-dentista que solicitou o trabalho.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
(B) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(C) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
(D) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

Questão 13

(Correta: A)

Após uma exodontia, o paciente pede ao cirurgião-dentista um documento que comprove, perante o empregador, a necessidade de se ausentar do trabalho durante a recuperação. Considerando a Lei Federal nº 5.081/1966, assinale a alternativa que descreve corretamente a conduta do profissional.

(A) Emitir atestado, já que lhe compete "atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive, para justificação de faltas ao emprego".
(B) Redigir atestado que abranja também a hipertensão relatada na anamnese, pois a lei confere ao cirurgião-dentista a atestação de estados mórbidos sem vínculo com sua área.
(C) Condicionar o atestado à perícia odontolegal em sede administrativa, pois a lei exige esse exame prévio para que o documento sirva à justificação de faltas ao emprego.
(D) Fornecer declaração de comparecimento, pois a lei reserva o atestado odontológico às finalidades periciais, ficando com o médico a justificação de faltas.

Questão 14

(Correta: B)

As precauções-padrão são medidas de prevenção utilizadas _____ diagnóstico confirmado ou presumido de doença infecciosa transmissível no paciente, e o

material perfurocortante deve ser desprezado, _____, em recipiente com tampa e resistente a perfuração.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

(A) na vigência de - quando contaminado por sangue.
(B) independentemente de - mesmo que estéril.
(C) independentemente de - quando contaminado por sangue.
(D) na vigência de - mesmo que estéril.

Questão 15

(Correta: B)

Um cirurgião-dentista que divide a clínica com outros profissionais enfrenta situações que envolvem seus deveres perante pacientes e colegas. Considerando o Código de Ética Odontológica, registre (V), para verdadeiro, e (F), para falso.

(__)O abandono do paciente por motivo justificável exige a conciliação dos honorários e a informação sobre a necessidade de continuidade do tratamento.

(__)A responsabilidade pelos atos praticados é transferida ao paciente quando o procedimento foi por ele solicitado e consentido após os esclarecimentos.

(__)Deixar de atender paciente que procure cuidados em caso de urgência, quando não haja outro cirurgião-dentista em condições de fazê-lo, é infração ética.

(__)A crítica a erro técnico-científico de colega ausente é admitida quando dirigida ao paciente atendido por ambos, para orientar a sequência do tratamento.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) V, V, F, F.
(B) V, F, V, F.
(C) F, F, V, V.
(D) F, V, F, V.

Fundamentos Clínicos e Planejamento Reabilitador

Questão 16

(Correta: D)

Durante o exame clínico oclusal, o cirurgião-dentista observa quais dentes conduzem a mandíbula quando ela se desloca lateralmente a partir da máxima intercuspidação, avaliando o esquema de desoclusão presente. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.Em arcos com caninos bem posicionados, é desejável que, no movimento de lateralidade, os caninos do lado de trabalho promovam a desoclusão dos dentes posteriores.

PORQUE

II.Os caninos têm raízes longas e volumosas, circundadas por osso compacto denso, o que os torna mais aptos que os dentes posteriores a tolerar forças horizontais.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
(B) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(C) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(D) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

Questão 17

(Correta: C)

Paciente adulta queixa-se de exposição gengival excessiva ao sorrir e deseja reabilitar os incisivos superiores. Na avaliação estética e funcional, observam-se terços faciais proporcionais, lábio superior com comprimento e mobilidade normais, plano oclusal sem degrau na região anterior e incisivos centrais de aspecto curto e quadrado, com a margem gengival sobre o esmalte e a junção cemento-esmalte detectada à sondagem em posição apical à margem. Com base nesses achados, o planejamento interdisciplinar prevê, antes da reabilitação protética:

(A) impactação cirúrgica da maxila por osteotomia, para reduzir a exposição gengival pelo reposicionamento ósseo.
(B) intrusão ortodôntica dos incisivos superiores, para deslocar apicalmente as margens gengivais.
(C) aumento de coroa clínica por procedimento periodontal, para restabelecer o comprimento das coroas.
(D) reposicionamento cirúrgico do lábio superior, para limitar sua elevação durante o sorriso.

Questão 18

(Correta: C)

O controle neuromuscular da mandíbula depende de receptores sensitivos cujas informações, conduzidas ao sistema nervoso central, modulam reflexos que protegem as estruturas do sistema estomatognático e mantêm sua função. Associe cada receptor da Coluna I à respectiva atuação descrita na Coluna II.

Coluna I

1.Fusos musculares.

2.Órgãos tendinosos de Golgi.

3.Mecanorreceptores do ligamento periodontal.

4.Nociceptores.

Coluna II

(__)Informam a intensidade e a direção das cargas aplicadas aos dentes durante a mastigação.

(__)Detectam o estiramento dos elevadores e desencadeiam sua contração reflexa, mantendo a postura mandibular contra a gravidade.

(__)Diante de estímulo lesivo súbito, como a mordida inesperada em objeto duro, provocam inibição dos elevadores e ativação dos abaixadores.

(__)Dispostos em série com as fibras contráteis, junto às inserções, detectam a tensão gerada na contração e podem inibi-la reflexamente.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

(A) 3, 2, 4, 1.
(B) 4, 2, 3, 1.
(C) 3, 1, 4, 2.
(D) 4, 1, 3, 2.

Questão 19

(Correta: D)

Paciente adulto procura reabilitação protética e, ao exame, apresenta dor espontânea no dente 36, lesões de cárie cavitadas ativas em vários dentes, sangramento à sondagem generalizado e ausências dentárias posteriores. Sobre a sequência do plano de tratamento desse paciente, analise as afirmativas a seguir.

I.O alívio da dor espontânea no dente 36 integra a fase de urgência do plano, que antecede a adequação do meio bucal.

II.A adequação do meio bucal, com remoção do tecido cariado e selamento provisório das cavidades associados à raspagem, antecede os procedimentos protéticos definitivos.

III.A reavaliação, feita após a instalação das próteses definitivas, é a etapa que confirma o controle da atividade de cárie e da inflamação periodontal.

É correto o que se afirma em:

(A) I, apenas.
(B) I, II e III.
(C) II, apenas.
(D) I e II, apenas.

Questão 20

(Correta: B)

Na avaliação pré-protética de um paciente com ausências dentárias e queixa relacionada à articulação temporomandibular, o cirurgião-dentista associa os achados do exame clínico aos exames complementares para completar o diagnóstico. A respeito dessa avaliação, registre (V), para verdadeiro, e (F), para falso.

(__)O estalido que ocorre na abertura e se repete no fechamento, em pontos distintos do trajeto, é compatível com deslocamento do disco com redução.

(__)Na avaliação periodontal dos futuros pilares, o nível de inserção clínica é medido da junção cemento-esmalte até o fundo do sulco ou da bolsa sondável.

(__)A tomografia computadorizada de feixe cônico permite avaliar a posição do disco articular, por representar com nitidez os tecidos moles da articulação.

(__)A radiografia panorâmica permite mensurar a espessura vestibulolingual do rebordo alveolar na região em que se planeja instalar implantes.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) F, F, V, F.
(B) V, V, F, F.
(C) V, F, V, V.
(D) F, V, F, V.

Prótese Dentária

Questão 21

(Correta: A)

Um incisivo central superior receberá coroa metalocerâmica, e a exigência estética leva o cirurgião-dentista a posicionar o término do preparo no interior do sulco gengival. A sondagem vestibular registra 1 mm de profundidade de sulco e 3 mm entre a margem gengival livre e a crista óssea. Considerando as dimensões dos tecidos supracrestais, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.

(A) Situar o término cerca de 0,5 mm apical à margem gengival, preservando aproximadamente 2,5 mm até a crista óssea alveolar.
(B) Levar o término 1,5 mm apical à margem gengival, visto que a sonda subestima a profundidade histológica do sulco.
(C) Posicionar o término a 1 mm da crista óssea, faixa da inserção conjuntiva, que tolera o contato com a restauração.
(D) Estender o término sobre o epitélio juncional quando houver polimento, pois a inflamação decorre do biofilme e não da margem.

Questão 22

(Correta: C)

Na prova clínica de uma coroa metalocerâmica unitária, antes da cimentação, os ajustes seguem uma sequência em que cada verificação depende do assentamento obtido na anterior. Considere as etapas listadas a seguir.

(1)Ajuste dos contatos oclusais em máxima intercuspidação e nos movimentos excursivos.

(2)Avaliação da adaptação marginal com sonda exploradora.

(3)Ajuste dos contatos proximais com auxílio de fio

dental.

(4)Polimento das áreas ajustadas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta em que essas etapas devem ser realizadas.

(A) 2, 3, 4, 1.
(B) 1, 3, 2, 4.
(C) 3, 2, 1, 4.
(D) 3, 2, 4, 1.

Questão 23

(Correta: D)

Usuários de próteses removíveis podem desenvolver lesões e alterações relacionadas ao uso das peças. Associe cada complicação da Coluna I ao quadro clínico correspondente da Coluna II.

Coluna I

1.Queilite angular.

2.Estomatite protética.

3.Hiperplasia fibrosa inflamatória.

4.Úlcera traumática.

Coluna II

(__)Pregas teciduais firmes no fundo de vestíbulo, junto à borda sobre-estendida de prótese mal adaptada.

(__)Eritema difuso da mucosa palatina recoberta pela base, associado a biofilme colonizado por Candida.

(__)Fissuras e eritema nas comissuras labiais, favorecidos pela redução da dimensão vertical de oclusão.

(__)Lesão dolorosa e localizada surgida poucos dias após a instalação, em área de pressão da prótese.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

(A) 3, 2, 4, 1.
(B) 4, 2, 1, 3.
(C) 2, 3, 1, 4.
(D) 3, 2, 1, 4.

Questão 24

(Correta: A)

Uma coroa unitária sobre implante será confeccionada em região cuja plataforma ficou 4 mm abaixo da margem da mucosa peri-implantar, e a forma de retenção da coroa, parafusada ou cimentada, será definida no planejamento. Sobre essa decisão, assinale a alternativa correta.

(A) A retenção parafusada evita a permanência de agente de fixação subgengival e permite remover a coroa na manutenção.
(B) O cimento radiopaco permite localizar, na radiografia periapical, sobras nas faces vestibular e lingual do pilar.
(C) Na retenção cimentada, o término profundo do pilar favorece a remoção das sobras, que extravasam em direção coronária.
(D) Com a retenção parafusada, o orifício de acesso ocupa a face vestibular da coroa, o que contraindica seu uso anterior.

Questão 25

(Correta: C)

O controle periódico do paciente reabilitado com prótese parcial removível de extremidade livre avalia a adaptação da base e as condições dos dentes pilares. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.A perda de adaptação da base ao rebordo reabsorvido é identificada quando a prótese gira em torno da linha de fulcro sob pressões alternadas na base e no retentor indireto.

PORQUE

II.Os dentes em contato com grampos e conectores tendem a acumular mais biofilme, o que eleva o risco de cárie e de doença periodontal nesses pilares.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
(B) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(C) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
(D) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

Questão 26

(Correta: D)

Em simpósio realizado na Universidade McGill, em Montreal, especialistas concluíram que a sobredentadura mandibular retida por _____ implantes deve ser considerada a primeira opção de tratamento para o paciente com mandíbula edêntula.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) um
(B) três
(C) quatro
(D) dois

Questão 27

(Correta: A)

Uma prótese parcial fixa metalocerâmica de três elementos substituirá um primeiro molar inferior, e o desenho do pôntico e dos conectores precisa conciliar

higiene e resistência mecânica. Acerca do assunto, analise as afirmativas a seguir e registre (V), para verdadeiro, e (F), para falso.

(__)O pôntico higiênico, afastado do rebordo, é indicado para a região posterior inferior, de menor exigência estética.

(__)O pôntico em sela, com superfície côncava que recobre o rebordo, facilita a passagem do fio dental sob a prótese.

(__)A rigidez do conector cresce mais com o aumento da largura vestibulolingual do que com o da altura ocluso-gengival.

(__)A flexão da prótese aumenta com o cubo do comprimento do espaço protético, mantidas as demais dimensões da peça.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) V, F, F, V.
(B) V, V, F, F.
(C) F, V, V, F.
(D) F, F, V, V.

Questão 28

(Correta: D)

Na moldagem de preparos com término subgengival pela técnica do duplo fio, um fio de menor calibre é inserido no fundo do sulco e, sobre ele, um fio de maior calibre, que promove o afastamento lateral da gengiva. No momento da injeção do material de moldagem, _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) o fio de menor calibre é removido e o de maior calibre permanece no sulco.
(B) os dois fios permanecem no sulco e mantêm o afastamento durante a presa.
(C) os dois fios são removidos para que o material registre a área apical ao término.
(D) o fio de maior calibre é removido e o de menor calibre permanece no sulco.

Questão 29

(Correta: D)

A seleção de dentes pilares para uma prótese parcial fixa envolve a análise das raízes e do suporte periodontal, que determinam o prognóstico da reabilitação. Sobre esses critérios, analise as afirmativas a seguir.

I.A proporção coroa-raiz de 2:3 é considerada ótima para um pilar, e a proporção de 1:1 é a mínima aceitável.

II.A área de superfície radicular dos pilares deve ser igual ou maior que a dos dentes a serem substituídos.

III.Raízes cônicas ou fusionadas conferem ao pilar maior estabilidade que raízes multirradiculares separadas.

É correto o que se afirma em:

(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I, II e III.
(D) I e II, apenas.

Questão 30

(Correta: B)

O preparo de um dente para coroa total obedece a princípios que orientam cada detalhe do desgaste. Associe cada princípio da Coluna I ao procedimento correspondente da Coluna II.

Coluna I

1.Preservação da estrutura dentária.

2.Retenção e resistência.

3.Durabilidade estrutural da restauração.

4.Integridade marginal.

Coluna II

(__)Confecção de sulcos axiais ou caixas proximais em preparo com paredes axiais curtas.

(__)Bisel na cúspide funcional, que garante espessura de material na área de contato oclusal.

(__)Término com contorno nítido e contínuo, que permite a adaptação precisa da borda da coroa.

(__)Indicação de coroa parcial quando as faces vestibular e lingual estão hígidas.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

(A) 1, 3, 4, 2.
(B) 2, 3, 4, 1.
(C) 3, 2, 4, 1.
(D) 2, 4, 3, 1.

Questão 31

(Correta: B)

As siliconas empregadas na moldagem de preparos diferem quanto à reação de polimerização, o que repercute no prazo disponível para o vazamento do gesso. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.O molde de silicona de condensação mantém estabilidade dimensional por vários dias, o que permite adiar o vazamento do gesso sem perda de precisão.

PORQUE

II.A polimerização da silicona de condensação libera álcool etílico como subproduto, cuja evaporação provoca contração do material.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa

correta.

(A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
(B) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(D) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

Questão 32

(Correta: A)

Uma arcada inferior classe I de Kennedy, com os primeiros pré-molares como últimos dentes remanescentes, será reabilitada com prótese parcial removível de extremidade livre bilateral. Sobre o planejamento dessa prótese, analise as afirmativas a seguir.

I.O conjunto formado por apoio mesial, placa proximal e grampo em I reduz o torque sobre o pilar quando a base se desloca em direção ao rebordo.

II.O apoio oclusal fica preferencialmente na fossa distal do pilar, junto ao espaço desdentado, para reduzir o torque distal sobre o dente.

III.A técnica do modelo modificado registra a área desdentada sob carga funcional e compensa a diferença de resiliência entre pilar e rebordo.

É correto o que se afirma em:

(A) I e III, apenas.
(B) I, II e III.
(C) III, apenas.
(D) I, apenas.

Questão 33

(Correta: A)

Na prótese total superior, a retenção depende do selamento periférico, que, na borda posterior da base, não conta com o fundo de sulco para se estabelecer. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.O selamento palatino posterior da prótese total superior é obtido pela compressão dos tecidos na área situada entre as linhas vibratórias anterior e posterior.

PORQUE

II.Os tecidos dessa área são resilientes e deslocáveis, o que permite à base comprimi-los e manter contato com a mucosa durante os movimentos funcionais.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
(C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

Questão 34

(Correta: B)

Um incisivo central superior tratado endodonticamente, com ampla perda de estrutura coronária, será restaurado com núcleo e coroa, e o planejamento considera fundamentos biomecânicos e estéticos. Acerca do assunto, analise as afirmativas a seguir e registre (V), para verdadeiro, e (F), para falso.

(__)A férula, faixa de dentina coronária circundada pela coroa acima do término, aumenta a resistência do dente à fratura.

(__)O pino intrarradicular reforça a raiz tratada endodonticamente e está indicado ainda que o remanescente retenha o núcleo.

(__)No sorriso harmônico, as bordas incisais dos dentes anterossuperiores acompanham a curvatura do lábio inferior.

(__)Pela proporção áurea, a largura aparente do incisivo lateral equivale a cerca de 1,6 vez a do incisivo central.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) F, V, V, F.
(B) V, F, V, F.
(C) V, F, F, V.
(D) F, V, F, V.

Questão 35

(Correta: A)

No fluxo digital, o material escolhido para a restauração define a forma de fabricação e o tratamento posterior da peça. Associe cada processo da Coluna I à característica correspondente da Coluna II.

Coluna I

1.Usinagem de zircônia pré-sinterizada.

2.Usinagem de dissilicato de lítio em estágio intermediário.

3.Estereolitografia.

4.Fusão seletiva a laser.

Coluna II

(__)Peça cristalizada em forno após o fresamento, passando da coloração azulada à cor do dente.

(__)Consolidação de pó metálico de cobalto-cromo, camada a camada, por feixe de energia concentrado.

(__)Peça fresada em dimensões ampliadas para compensar a contração da queima final em alta temperatura.

(__)Polimerização de resina líquida por luz ultravioleta, camada a camada, no interior de uma cuba.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

(A) 2, 4, 1, 3.
(B) 1, 3, 2, 4.
(C) 1, 4, 2, 3.
(D) 2, 3, 1, 4.

Questão 36

(Correta: A)

Na reabilitação oral de um paciente dentado, os modelos são montados em articulador semiajustável, e cada registro depende da posição já estabelecida pelo registro anterior. Considere as etapas listadas a seguir.

(1)Montagem do modelo inferior com o registro interoclusal em relação cêntrica.

(2)Ajuste da inclinação da guia condilar com o registro protrusivo.

(3)Transferência da relação do arco superior com o eixo de rotação por meio do arco facial.

(4)Montagem do modelo superior no ramo superior do articulador.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta de execução dessas etapas.

(A) 3, 4, 1, 2.
(B) 4, 3, 1, 2.
(C) 1, 3, 2, 4.
(D) 3, 4, 2, 1.

Questão 37

(Correta: C)

Quando a base de uma prótese total perde adaptação ao rebordo, mas a oclusão, a estética e a dimensão vertical permanecem satisfatórias, indica-se o procedimento de _____, que acrescenta nova camada de resina definitiva à superfície interna da base.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) condicionamento tecidual
(B) troca de base
(C) reembasamento
(D) reparo

Questão 38

(Correta: D)

Após a instalação de próteses totais em um paciente idoso, o cirurgião-dentista orienta o uso, a higiene e a conservação das peças. Acerca do assunto, analise as afirmativas a seguir e registre (V), para verdadeiro, e (F), para falso.

(__)As próteses são removidas durante o sono, o que reduz o risco de estomatite associada ao uso contínuo.

(__)A higiene diária combina escovação e imersão em produto de limpeza específico e não abrasivo para próteses.

(__)A imersão em água próxima da fervura é recomendada para desinfetar diariamente a base de resina acrílica.

(__)O creme dental convencional com escova de cerdas duras é indicado para remover o biofilme aderido à base acrílica.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) F, V, F, V.
(B) V, F, V, F.
(C) F, V, V, F.
(D) V, V, F, F.

Questão 39

(Correta: B)

O cirurgião-dentista vai solicitar ao laboratório uma coroa de cerâmica vítrea para um incisivo central superior tratado endodonticamente, cujo remanescente preparado apresenta escurecimento acentuado. Sobre a comunicação da cor ao técnico, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.

(A) Registrar a cor sob a luz do refletor do equipo, que fornece iluminação intensa e homogênea ao dente.
(B) Informar a cor do substrato dentário, dado que orienta a escolha da opacidade do material restaurador.
(C) Selecionar a cor após o preparo sob isolamento absoluto, quando o dente desidratado estabiliza o valor.
(D) Fotografar a escala de cor em plano posterior ao do dente, evitando que o reflexo da guia interfira na leitura.

Questão 40

(Correta: D)

Uma onlay de cerâmica vítrea reforçada por dissilicato de lítio será fixada com cimento resinoso em um primeiro molar inferior, e o cirurgião-dentista precisa preparar a peça para obter adesão estável. Com esse objetivo, assinale a alternativa que descreve o tratamento indicado para a superfície interna da peça.

(A) Aplicação de ácido fosfórico a 37% por 60 segundos, seguida de camada de adesivo convencional.
(B) Exposição ao ácido fluorídrico a 10% por 2 minutos, seguida de aplicação de silano.
(C) Jateamento com óxido de alumínio, seguido de aplicação de primer à base de monômero fosfatado.
(D) Condicionamento com ácido fluorídrico a 5% por 20 segundos, seguido de aplicação de silano.