PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2026

ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES A SEGUIR.

- Verifique se o Caderno de Questões está completo e se o cargo indicado corresponde à sua inscrição. Havendo qualquer irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- A prova tem duração de 3 horas e 30 minutos, incluído o tempo destinado ao preenchimento da Folha de Respostas. O tempo mínimo de permanência em sala é de 1 hora e 45 minutos.
- Este caderno contém 40 questões objetivas. Utilize-o apenas como rascunho. As respostas somente serão consideradas válidas quando assinaladas na Folha de Respostas.
- Na Folha de Respostas, marque apenas uma alternativa por questão, utilizando caneta esferográfica azul ou preta. Questões com dupla marcação, rasuradas ou em branco serão anuladas.
- Não haverá substituição do Caderno de Questões nem da Folha de Respostas por erro do candidato.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos, após a assinatura da ata.
- Não se esqueça de assinar e registrar sua impressão digital na Folha de Respostas a ser entregue ao fiscal no final da prova.
- Somente será permitido ao candidato levar consigo o Caderno de Questões nos 30 (trinta) minutos que antecedem o horário oficial de término da prova. Caso o candidato deixe a sala antes desse tempo, deverá entregar ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, esta devidamente assinada e com a impressão digital registrada.
- O candidato que deixar a sala antes dos 30 minutos finais do tempo de duração da prova e não devolver o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, terá sua prova anulada.

✂----------

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2026

O espaço abaixo é destinado à anotação das respostas. Este canhoto poderá ser levado consigo. Solicite ao fiscal que o destaque.
A divulgação dos editais de resultado está prevista para quarta-feira a partir das 18h nos sites: www.ibamsp-concursos.org.br/ e dom.maua.sp.gov.br

01-	02-	03-	04-	05-	06-	07-	08-	09-	10-
11-	12-	13-	14-	15-	16-	17-	18-	19-	20-
21-	22-	23-	24-	25-	26-	27-	28-	29-	30-
31-	32-	33-	34-	35-	36-	37-	38-	39-	40-

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 3.

A agilidade no atendimento das ambulâncias é essencial para a sobrevida dos pacientes e para a eficiência dos cuidados pré-hospitalares. A maioria dos casos emergenciais exige precisão e rapidez nos cuidados, devido à existência de lesões que se estabelecem com uma velocidade muito grande e que podem gerar sequelas permanentes ou até levar ao óbito. Logo, quanto mais rápido o serviço de atendimento móvel de urgência chegar ao local da ocorrência, melhores são as condições de socorro imediato e de transporte para uma unidade de emergência.

Exemplos como parada cardiorrespiratória, traumas com lesões vasculares e nervosas, acidente vascular cerebral (AVC) e infarto agudo do miocárdio são ocorrências que evidenciam a necessidade de agilidade no atendimento pré-hospitalar. A chegada das ambulâncias e o uso de recursos e equipamentos nos primeiros dez minutos após o ocorrido são determinantes para melhorar a sobrevida dos pacientes nesses casos.

Um médico emergencista ressalta a importância da conscientização dos motoristas e dos usuários na facilitação do atendimento e da passagem das ambulâncias. A chegada até o paciente e seu transporte dependem também da educação e do conhecimento das pessoas no trânsito sobre a gravidade de um caso emergencial, para que ofereçam passagem às viaturas e evitem retenções no engarrafamento.

Reconhecer a importância da agilidade é essencial para evitar acionamentos desnecessários da ambulância, como transportes simples de casos sem gravidade até unidades de saúde e situações de aplicação de trotes. A movimentação sem necessidade do serviço pode atrapalhar o socorro de emergências que realmente precisam do atendimento.

RADAELLI, Gustavo. Agilidade no socorro pode salvar vidas: atraso no trânsito compromete atendimentos do SAMU. Jornal da USP, São Paulo, 7 abr. 2026. Disponível em: https://jornal.usp.br/noticias/artigo-indica-que-agilidade-no-atendimento-de-ambulancias-e-essencial-para-a-sobrevida-dos-pacientes/. Acesso em: 30 set. 2026. (Adaptado.)

Questão 01

(Correta: A)

A pontuação do texto contribui para delimitar orações, isolar conectivos e distinguir informações essenciais de informações acessórias. Os trechos analisados nas alternativas foram retirados do texto, e alguns deles aparecem com supressões indicadas por colchetes.

Considerando os empregos da vírgula no texto, assinale a alternativa correta.

(A) Em "Logo, quanto mais rápido o serviço [...] chegar ao local da ocorrência, melhores são as condições", as vírgulas isolam o conector e delimitam a oração proporcional anteposta.

(B) Em "A maioria dos casos emergenciais exige precisão e rapidez nos cuidados, devido à existência de lesões", a vírgula separa uma oração subordinada adverbial causal da principal.

(C) Em "lesões que se estabelecem com uma velocidade muito grande e que podem gerar sequelas", a inserção de vírgula antes do primeiro "que" manteria inalterado o sentido do trecho.

(D) Em "Exemplos como parada cardiorrespiratória, [...] e infarto agudo do miocárdio são ocorrências", caberia uma vírgula antes de "são", para separar a longa enumeração do predicado.

Questão 02

(Correta: A)

O texto discute o atendimento pré-hospitalar em situações de urgência e emergência, relacionando o tempo de resposta das equipes à evolução clínica dos pacientes e a atitudes da população diante do serviço. A leitura exige distinguir o que o texto afirma, o que ele permite inferir e o que extrapola seus limites.

Da leitura global do texto, infere-se corretamente que:

(A) a eficiência do socorro depende também de fatores externos às equipes de saúde, como a conduta dos motoristas e o uso adequado do serviço pela população.

(B) a gravidade dos casos emergenciais decorre, segundo o texto, da demora na chegada das ambulâncias, que seria a causa principal das sequelas permanentes.

(C) o intervalo de dez minutos é apresentado como limite a partir do qual o atendimento pré-hospitalar deixa de ter influência sobre a sobrevida dos pacientes.

(D) os acionamentos desnecessários prejudicam o serviço porque expõem as equipes a riscos no trânsito, sobretudo nos deslocamentos feitos em alta velocidade.

Questão 03

(Correta: B)

No texto, a escolha das preposições que acompanham verbos e nomes obedece à regência prevista na norma-padrão, e eventuais substituições lexicais podem manter ou alterar essa exigência, conforme o termo regente empregado. A análise deve considerar as construções abonadas pela norma-padrão para cada verbo.

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.Em "emergências que realmente precisam do atendimento", a substituição de "precisam do" por "necessitam o" preservaria a correção gramatical do

trecho.

PORQUE

II.O verbo "precisar", no sentido de "ter necessidade", constrói-se com a preposição "de", regência que a norma-padrão também impõe ao verbo "necessitar".

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
(B) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
(C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
(D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 4 a 5.

Os números relativos aos traumas cranioencefálicos são elevados. Anualmente, de cada 100 mil pessoas, entre 350 e 400 vão apresentar esse trauma, e 10% vão morrer em decorrência desse tipo de lesão. É preciso estar atento aos sintomas após uma batida na cabeça: a pessoa pode apresentar perda da consciência, amnésia, confusão mental, irritabilidade, sonolência e pouca responsividade, além de dor de cabeça e vômitos que não melhoram ou fraqueza de algum lado do corpo.

Existem idades em que é preciso estar mais atento após uma batida. Crianças abaixo de 1 ano e, principalmente, idosos acima de 65 anos têm maior risco tanto de sofrer o trauma cranioencefálico quanto de este se apresentar de forma mais grave. Às vezes, um trauma de menor energia, como a queda da própria altura em idosos ou a queda do berço, da cama ou do colo, já pode causar sintomas.

Normalmente, uma batida na cabeça não requer pânico, mas existem situações que necessitam de mais atenção. Quando isso acontece com idosos, com pessoas que têm algum problema de coagulação ou com quem cai sem proteção, como no caso do abuso de álcool, o aparecimento de algum daqueles sintomas pode indicar uma forma grave de traumatismo craniano.

A prevenção é o mais importante para evitar acidentes. É preciso muita atenção às leis de trânsito, usar o cinto de segurança, não dirigir embriagado e, em casa, prevenir acidentes domésticos, com cuidado redobrado com crianças, escadas, baixa luminosidade, piso molhado e tapetes. Se, mesmo assim, um acidente acontecer, é necessário prestar atenção aos sinais apresentados e, se preciso, procurar rapidamente atendimento médico, de preferência em um hospital com tomografia.

LEMOS, Simone. Batidas na cabeça nem sempre trazem maiores consequências, mas é preciso estar atento. Jornal da USP, São Paulo, 26 jun. 2025. Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/batidas-na-cabeca-nem-sempre-trazem-maiores-consequencias-mas-e-preciso-estar-atento/. Acesso em: 30 set. 2026. (Adaptado.)

Questão 04

(Correta: C)

O texto organiza a informação sobre o trauma cranioencefálico em uma progressão que parte do dimensionamento do problema e chega à orientação do leitor, de modo que cada parágrafo cumpre função específica nesse percurso. Analise as descrições a seguir, referentes à função de cada parágrafo.

I.Relativização do alarme, acompanhada da indicação de condições e circunstâncias que tornam o quadro potencialmente grave.

II.Exposição da magnitude do problema e enumeração dos sinais que devem ser observados após o impacto.

III.Recomendações para evitar acidentes e orientação de conduta caso eles ocorram, com indicação do serviço a procurar.

IV.Identificação das faixas etárias mais vulneráveis e reconhecimento de que impactos de menor intensidade podem produzir sintomas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correspondente à ordem dos parágrafos no texto, do primeiro ao último.

(A) II → I → IV → III.
(B) IV → II → I → III.
(C) II → IV → I → III.
(D) II → IV → III → I.

Questão 05

(Correta: B)

A acentuação gráfica obedece a regras que consideram a posição da sílaba tônica, a terminação das palavras e, em alguns casos, a necessidade de distinguir formas homógrafas. As palavras analisadas nas alternativas foram retiradas do texto, e a forma "saúde", citada em uma delas, funciona como termo de comparação.

Considerando as regras de acentuação gráfica vigentes, assinale a alternativa correta.

(A) A ausência de acento gráfico em "tomografia" contraria a norma vigente, pois o "i" tônico forma hiato com a vogal seguinte, como ocorre na palavra "saúde".
(B) "Vômitos", "pânico" e "trânsito" são acentuadas pela regra que alcança as proparoxítonas, e o circunflexo, e não o agudo, decorre do timbre da vogal tônica.
(C) Em "idosos acima de 65 anos têm maior risco", o acento de "têm" obedece à regra das oxítonas terminadas em "-em", a mesma que justifica o acento de "também".

(D) Os vocábulos "cranioencefálicos" e "domésticos" recebem acento gráfico por se enquadrarem na regra das paroxítonas terminadas em "o", seguida ou não de "s".

Sistema Único de Saúde e Rede de Urgência e Emergência

Questão 06

(Correta: B)

Na rede de urgências, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) ocupa posição intermediária entre a atenção básica e a rede hospitalar e, com esses níveis, compõe uma rede organizada de atenção às urgências. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.O paciente cuja queixa não se resolve durante a observação na UPA 24h deve ser encaminhado para internação em serviço hospitalar de retaguarda, por meio da regulação do acesso assistencial.

PORQUE

II.Na UPA 24h, a observação do paciente, destinada à elucidação diagnóstica ou à estabilização clínica, estende-se por até 24 horas.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
(C) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(D) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

Questão 07

(Correta: A)

A Rede de Atenção às Urgências conecta serviços pré-hospitalares, hospitalares e domiciliares por fluxos de encaminhamento e de retorno do usuário entre os pontos de atenção. Acerca dessa rede, registre V, para verdadeiro, e F, para falso.

(__)A organização da rede tem a finalidade de articular e integrar os equipamentos de saúde, para ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral nas urgências.

(__)As linhas de cuidado priorizadas pela rede são a cardiovascular, a cerebrovascular e a obstétrica, que orientam a organização da atenção às urgências na região.

(__)As portas hospitalares de urgência destinam-se às demandas referenciadas pela central de regulação, e a demanda espontânea é atendida pelos demais pontos da rede.

(__)Na porta hospitalar qualificada, a contrarreferência ocorre com relatório adequado, para a continuidade do cuidado pela equipe da atenção básica ou de referência.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) V, F, F, V.
(B) V, V, F, F.
(C) F, V, V, F.
(D) F, F, V, V.

Questão 08

(Correta: C)

Em uma região de saúde, a gestão implantou a identificação dos usuários por cartão, o registro eletrônico em saúde, as centrais de regulação e o transporte sanitário. Na estrutura operacional das redes de atenção à saúde, esse conjunto compõe um dos componentes da rede. Assinale a alternativa que identifica e caracteriza corretamente esse componente.

(A) Sistemas de apoio, lugares institucionais que prestam serviços comuns aos diversos pontos de atenção à saúde da rede.
(B) Sistema de governança, capacidade de intervenção de diferentes atores voltada à gestão regional compartilhada da rede.
(C) Sistemas logísticos, soluções ancoradas nas tecnologias de informação e ligadas ao conceito de integração vertical da rede.
(D) Centro de comunicação, papel exercido pela atenção primária como ordenadora da rede e coordenadora do cuidado.

Questão 09

(Correta: A)

Na atenção às urgências, a rede reúne serviços pré-hospitalares fixos e móveis, serviços hospitalares e cuidados pós-hospitalares, com papéis distintos na assistência ao usuário. A respeito de componentes dessa rede, analise as afirmativas a seguir.

I.Na atenção básica, cabe o primeiro cuidado às urgências, em ambiente adequado, até a transferência ou o encaminhamento a outro ponto de atenção, se necessário.

II.A sala de estabilização configura novo serviço de saúde, destinado a absorver a demanda espontânea de urgência da localidade em que funciona vinculada a um equipamento de saúde.

III.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) faz atendimento secundário quando a solicitação parte de serviço de saúde que já prestou o primeiro atendimento ao paciente.

É correto o que se afirma em:

(A) I e III, apenas.
(B) I, II e III.
(C) I, apenas.
(D) III, apenas.

Questão 10

(Correta: D)

Com base exclusivamente no Anexo III da Portaria de Consolidação do Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde (GM/MS) nº 3/2017, sem considerar jurisprudência ou doutrina, o acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a _____ na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências e devem ser requisitos de todos os pontos de atenção.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) longitudinalidade.
(B) humanização.
(C) integralidade.
(D) resolutividade.

Ética, Legislação, Processo de Enfermagem e Segurança do Paciente

Questão 11

(Correta: B)

Na montagem da escala de um pronto-socorro, a coordenação distribui as atividades entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Com base exclusivamente na Lei Federal nº 7.498/1986, sem considerar jurisprudência ou doutrina, analise as afirmativas a seguir.

I.A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício.

II.Ao Auxiliar de Enfermagem cabe especialmente observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, executar ações de tratamento simples e prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente.

III.Ao Técnico de Enfermagem cabe executar ações assistenciais de enfermagem, incluídos os cuidados de maior complexidade técnica que exijam capacidade de tomar decisões imediatas.

É correto o que se afirma em:

(A) I, II e III.
(B) I e II, apenas.
(C) I, apenas.
(D) II, apenas.

Questão 12

(Correta: C)

Em uma unidade de urgência, o enfermeiro reorganiza a documentação e a divisão de tarefas do Processo de Enfermagem entre os membros da equipe, a fim de uniformizar a prática entre os plantões. Acerca desse processo, registre (V), para verdadeiro, e (F), para falso.

(__)Técnicos e auxiliares de enfermagem participam do processo com anotações, implementação dos cuidados prescritos e sua checagem, sob supervisão e orientação do enfermeiro.

(__)O diagnóstico de enfermagem pode ser formulado pelo técnico de enfermagem, desde que validado pelo enfermeiro supervisor no mesmo plantão de trabalho.

(__)O plano assistencial é compartilhado com os sujeitos do cuidado, como a pessoa e a família, e também com a equipe de enfermagem e de saúde da unidade.

(__)O registro de cada uma das etapas do processo no prontuário cabe aos membros da equipe de enfermagem, ficando com o enfermeiro a checagem da prescrição.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) V, V, F, F.
(B) F, F, V, V.
(C) V, F, V, F.
(D) F, V, F, V.

Questão 13

(Correta: C)

Na sala de emergência, um homem com dor torácica conta à enfermeira que usou um inibidor da fosfodiesterase-5 horas antes e pede que ninguém mais saiba disso, enquanto a equipe prepara a administração de nitrato sublingual. Nesse caso, em conformidade com o sigilo profissional, a enfermeira deve:

(A) relatar o fato aos familiares, por ter a família direito de ser esclarecida sobre os riscos.
(B) guardar o fato perante a equipe, por depender a revelação de consentimento escrito do paciente.
(C) revelar o fato ao médico da equipe, por ser informação necessária à prestação da assistência.
(D) aguardar ordem judicial para revelar o fato, por ser o juízo quem autoriza a quebra do segredo.

Questão 14

(Correta: D)

Nos serviços de urgência, punções venosas sucessivas expõem a equipe de enfermagem a material biológico, o que exige medidas de prevenção de acidentes e de agravos ocupacionais. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.Após a punção venosa, são vedados ao profissional o reencape e a desconexão manual da agulha utilizada.

PORQUE

II.A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria e hepatite B.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa

correta.

(A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
(B) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(D) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

Questão 15

(Correta: A)

Na emergência, após executar a prescrição, o enfermeiro examina os resultados alcançados pelo paciente e revisa o plano, etapa do Processo de Enfermagem denominada _____, conforme a avaliação dos resultados obtidos após a implementação.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) evolução de enfermagem.
(B) implementação de enfermagem.
(C) planejamento de enfermagem.
(D) avaliação de enfermagem.

Avaliação Clínica, Classificação de Risco e Gestão da Assistência

Questão 16

(Correta: B)

Vítima de colisão entre automóvel e motocicleta chega à sala de emergência, e o enfermeiro conduz a avaliação sistematizada do politraumatizado, que define a sequência de prioridades do atendimento. Sobre essa abordagem, analise as afirmativas a seguir.

I.No método XABCDE de avaliação primária, o controle da hemorragia externa grave precede a abordagem da via aérea com restrição do movimento da coluna cervical.

II.A avaliação secundária, com exame da cabeça aos pés e coleta da história, começa assim que a via aérea está garantida, antes de concluída a avaliação primária.

III.Na escala de coma de Glasgow, o paciente que abre os olhos à pressão, emite palavras inapropriadas e localiza o estímulo soma 10 pontos.

É correto o que se afirma em:

(A) I, II e III.
(B) I e III, apenas.
(C) I, apenas.
(D) III, apenas.

Questão 17

(Correta: D)

Paciente sob sedação contínua, incapaz de relatar a dor, é avaliado pela Behavioral Pain Scale (BPS), que pontua de 1 a 4 a expressão facial, os movimentos dos membros superiores e a _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) presença de sudorese.
(B) tensão muscular.
(C) variação da frequência cardíaca.
(D) adaptação ao ventilador.

Questão 18

(Correta: D)

Enfermeiro coordenador de um pronto-socorro revisa o controle de estoque de materiais e os registros e indicadores assistenciais da unidade. Acerca desses instrumentos, registre (V), para verdadeiro, e (F), para falso.

(__)O índice de quedas é calculado dividindo-se o número de quedas pelo número de pacientes-dia do período e multiplicando-se o resultado por 1.000.

(__)A densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter central utiliza como denominador o número de pacientes-dia do período.

(__)Na classificação XYZ de materiais, os itens da classe X são os de maior criticidade, cuja falta paralisa atividades essenciais e que não têm substituto.

(__)A evolução de enfermagem, que analisa os dados referentes a 24 horas, é registro privativo do enfermeiro, ao passo que a anotação cabe a toda a equipe.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens.

(A) F, F, V, V.
(B) V, V, V, F.
(C) F, V, F, F.
(D) V, F, F, V.

Questão 19

(Correta: C)

Durante o atendimento a uma parada cardiorrespiratória, o enfermeiro que coordena a equipe distribui as tarefas por meio de ordens verbais. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.Ao solicitar a administração de um medicamento, o líder aguarda que o membro designado repita a ordem e confirma que ela foi compreendida corretamente.

PORQUE

II.A comunicação em alça fechada destina-se a transmitir a informação crítica simultaneamente ao conjunto da equipe, sem designar um receptor específico.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

(B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

(C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

(D) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

Questão 20

(Correta: B)

Pelo National Early Warning Score 2 (NEWS2), paciente pós-operatório alerta, em ar ambiente e sem meta de saturação reduzida, tem frequência respiratória de 23 irpm, saturação de 95%, pressão sistólica de 105 mmHg, pulso de 115 bpm e temperatura de 38,4 °C. Assinale a alternativa correta sobre escore e resposta.

(A) 6 pontos, risco clínico médio, sinais vitais no mínimo de hora em hora e avaliação urgente por clínico capacitado em doença aguda.

(B) 7 pontos, risco clínico alto, monitorização contínua e avaliação de emergência por equipe com competência em cuidados críticos.

(C) 9 pontos, risco clínico alto, monitorização contínua e avaliação de emergência por equipe apta em cuidados críticos.

(D) 7 pontos, risco clínico médio, sinais vitais no mínimo de hora em hora e avaliação urgente à beira do leito pelo médico assistente.

Enfermagem em Urgência e Emergência

Questão 21

(Correta: D)

Em incidente com múltiplas vítimas, o método Simple Triage and Rapid Treatment (START) classifica cada adulto em poucos segundos, a partir de parâmetros simples. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.A vítima que não respira espontaneamente, mas volta a respirar após o posicionamento da via aérea, é classificada como prioridade imediata.

PORQUE

II.A frequência respiratória acima de 30 incursões por minuto é, no método START, critério de classificação como prioridade imediata.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

(B) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

(C) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

(D) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

Questão 22

(Correta: D)

Durante a reanimação de adulto em parada cardiorrespiratória, a equipe obtém a via de administração e prepara a epinefrina conforme o ritmo identificado no monitor. Sobre essa conduta, analise as afirmativas a seguir.

I.A via intravenosa é a tentativa inicial de acesso para os fármacos, e a intraóssea é usada se ela falhar ou for inviável.

II.No ritmo chocável, a epinefrina é administrada assim que houver acesso, antes da tentativa inicial de desfibrilação.

III.No ritmo não chocável, é razoável administrar a epinefrina tão logo seja possível, na dose de 1 mg a cada 3 a 5 minutos.

É correto o que se afirma em:

(A) I, apenas.

(B) III, apenas.

(C) I, II e III.

(D) I e III, apenas.

Questão 23

(Correta: C)

O estado de mal epiléptico convulsivo é tratado por fases sucessivas, definidas pelo tempo decorrido desde o início da crise. Considere as fases do tratamento listadas a seguir.

(1)Dose única e completa de benzodiazepínico, como midazolam intramuscular ou diazepam intravenoso.

(2)Doses anestésicas de tiopental, pentobarbital ou propofol, com monitorização eletroencefalográfica contínua.

(3)Primeiros cuidados à crise, com suporte à respiração, manutenção da pressão arterial e obtenção de acesso venoso.

(4)Fosfenitoína, ácido valproico ou levetiracetam por via intravenosa.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem cronológica correta dessas fases.

(A) 3, 4, 1, 2.

(B) 1, 3, 2, 4.

(C) 3, 1, 4, 2.

(D) 1, 3, 4, 2.

Questão 24

(Correta: B)

Adulto de 70 kg chega 2 horas após queimadura térmica, sem reposição prévia, com 18% de superfície corporal queimada de segundo grau, 12% de terceiro e 9% de primeiro. Pela fórmula de 2 mL/kg por percentual

queimado em 24 horas, metade nas 8 horas após a lesão, a vazão até concluir essa metade é de:

(A) 455 mL/h.
(B) 350 mL/h.
(C) 262,5 mL/h.
(D) 175 mL/h.

Questão 25

(Correta: C)

Em colisão entre veículos, a equipe de atendimento pré-hospitalar avalia várias vítimas antes do transporte. Segundo a posição conjunta das entidades de trauma e emergência sobre restrição de movimento da coluna, tem indicação dessa medida:

(A) o ciclista alerta de 70 anos, sem dor na coluna, sem déficit e sem lesão que desvie sua atenção.
(B) o pedestre alerta atingido por projétil de arma de fogo no tórax, sem sinais neurológicos focais.
(C) o motorista consciente, sem alterações neurológicas, que apresenta dor à palpação da região cervical posterior.
(D) o passageiro alerta, sem dor na coluna nem déficit, retirado de veículo capotado em alta velocidade.

Questão 26

(Correta: A)

Na unidade de emergência, adulto em choque séptico recebe cateter venoso central de curta permanência para infusão de vasopressor. Acerca da prevenção de infecção da corrente sanguínea relacionada a esse dispositivo, registre V, para verdadeiro, e F, para falso.

(__)Na inserção, são usados gorro, máscara, avental estéril, luvas estéreis e campo estéril que cubra todo o corpo do paciente.

(__)No adulto, o sítio subclávio é preferido ao jugular e ao femoral para o cateter não tunelizado, a fim de reduzir infecção.

(__)O cateter central é substituído de forma programada a cada sete dias, ainda que sem sinais de infecção ou mau funcionamento.

(__)A cobertura de filme transparente do sítio de inserção é trocada, no máximo, a cada sete dias.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) V, V, F, V.
(B) F, F, V, F.
(C) V, F, V, V.
(D) F, V, F, F.

Questão 27

(Correta: A)

Homem com doença pulmonar obstrutiva crônica chega ao pronto-socorro em exacerbação, com dispneia, uso de musculatura acessória e gasometria arterial pendente. Sobre a condução da insuficiência respiratória nesse paciente, analise as afirmativas a seguir.

I.Na acidose respiratória com potencial hidrogeniônico (pH) igual ou inferior a 7,35, está indicada a ventilação não invasiva com dois níveis de pressão.

II.Enquanto a gasometria não é conhecida, o oxigênio é titulado para manter a saturação periférica entre 88% e 92%.

III.Na hipercapnia com pH normal, a ventilação não invasiva é recomendada de rotina para prevenir a acidose respiratória.

É correto o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.
(B) I, II e III.
(C) I, apenas.
(D) II, apenas.

Questão 28

(Correta: C)

A hemorragia pós-parto tem suas causas agrupadas no mnemônico dos quatro Ts, que orienta a conduta da equipe. Associe cada causa da Coluna I ao achado clínico que lhe corresponde na Coluna II.

Coluna I

1.Tônus.

2.Trauma.

3.Tecido.

4.Trombina.

Coluna II

(__)Sangramento em locais de punção venosa e perda vaginal sem coágulos, em puérpera com plaquetopenia grave.

(__)Útero amolecido, palpado acima da cicatriz umbilical, com sangramento que diminui durante a massagem.

(__)Placenta com cotilédone ausente à revisão, com sangramento persistente nas horas seguintes ao parto.

(__)Útero firme e contraído, com sangramento vivo e contínuo após parto vaginal assistido por fórceps.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

(A) 3, 1, 4, 2.
(B) 3, 2, 4, 1.
(C) 4, 1, 3, 2.
(D) 4, 2, 3, 1.

Questão 29

(Correta: B)

Dois profissionais de saúde iniciam a reanimação cardiopulmonar de um lactente em parada cardiorrespiratória, ainda sem via aérea avançada instalada. Nessa situação, as compressões torácicas devem ser feitas com:

(A) a base de uma das mãos sobre o esterno, na relação de 15:2, deprimindo-o cerca de 5 cm.
(B) os dois polegares e as mãos envolvendo o tórax, na relação de 15:2, deprimindo-o cerca de 4 cm.
(C) os dois dedos sobre o esterno, abaixo da linha intermamilar, na relação de 15:2, deprimindo-o cerca de 4 cm.
(D) os polegares sobrepostos e as mãos envolvendo o tórax, na relação de 30:2, deprimindo-o cerca de 4 cm.

Questão 30

(Correta: A)

Vítima de ferimento penetrante no precórdio com hipotensão, turgência jugular, bulhas cardíacas abafadas e murmúrio vesicular presente bilateralmente apresenta quadro compatível com _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) tamponamento cardíaco.
(B) pneumotórax hipertensivo.
(C) hemotórax maciço.
(D) contusão miocárdica.

Questão 31

(Correta: A)

Minutos após receber antimicrobiano intravenoso, paciente apresenta urticária generalizada, broncoespasmo e hipotensão, quadro compatível com anafilaxia. Acerca da assistência imediata, registre (V), para verdadeiro, e (F), para falso.

(__)No adulto, a epinefrina de 1 mg/mL é administrada por via intramuscular na dose de 0,01 mg/kg, até o máximo de 0,5 mg.

(__)A injeção intramuscular é feita no vasto lateral da coxa e pode ser repetida a cada 5 a 15 minutos se os sintomas persistirem.

(__)O anti-histamínico H1 intravenoso é o fármaco inicial na hipotensão, e a epinefrina fica reservada aos casos refratários.

(__)A gestante em anafilaxia é mantida em decúbito dorsal horizontal, com elevação dos membros inferiores, para favorecer o retorno venoso.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) V, V, F, F.
(B) V, F, V, F.
(C) F, V, F, V.
(D) F, F, V, V.

Questão 32

(Correta: C)

Trabalhador rural é admitido com miose, sialorreia, broncorreia, sibilos e bradicardia minutos após manusear inseticida organofosforado sem equipamento de proteção. A conduta farmacológica indicada consiste em:

(A) naloxona intravenosa em doses repetidas, até a reversão da miose e da depressão do padrão respiratório.
(B) atropina intravenosa em doses repetidas, até a obtenção de midríase completa e ausência de ruídos hidroaéreos.
(C) atropina intravenosa em doses repetidas e progressivamente maiores, até o ressecamento das secreções brônquicas.
(D) atropina intravenosa em dose única, com suspensão do fármaco diante do surgimento de taquicardia.

Questão 33

(Correta: B)

No pronto atendimento, as alterações glicêmicas agudas são classificadas pela combinação de achados clínicos e laboratoriais. Associe cada condição da Coluna I ao quadro que lhe corresponde na Coluna II.

Coluna I

1.Cetoacidose diabética.

2.Estado hiperglicêmico hiperosmolar.

3.Hipoglicemia de nível 2.

4.Hipoglicemia de nível 3.

Coluna II

(__)Glicose capilar de 62 mg/dL em paciente sonolento, que depende da ajuda de terceiros para receber glicose.

(__)Glicose capilar de 48 mg/dL em paciente lúcido, que ingere sozinho o carboidrato que lhe é oferecido.

(__)Glicose plasmática de 280 mg/dL, beta-hidroxibutirato de 4,2 mmol/L e pH arterial de 7,18.

(__)Glicose plasmática de 780 mg/dL, sódio de 148 mEq/L, pH de 7,36, bicarbonato de 22 mmol/L e beta-hidroxibutirato de 0,6 mmol/L.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo.

(A) 4, 3, 2, 1.
(B) 4, 3, 1, 2.
(C) 3, 4, 2, 1.
(D) 3, 4, 1, 2.

Questão 34

(Correta: B)

Paciente com doença renal crônica chega ao pronto-socorro com potássio sérico de 7,1 mEq/L e ondas T apiculadas no eletrocardiograma. Associe cada medida da Coluna I ao seu efeito ou indicação na Coluna II.

Coluna I

1.Gluconato de cálcio intravenoso.

2.Insulina regular com glicose.

3.Poliestirenossulfonato de sódio.

4.Hemodiálise.

Coluna II

(__)Desloca o potássio do meio extracelular para o intracelular, reduzindo-o de modo transitório em cerca de 30 minutos.

(__)Retira o potássio do organismo quando não há resposta às demais medidas, como na destruição tecidual da rabdomiólise.

(__)Estabiliza a membrana do miocárdio e previne arritmias, sem reduzir a concentração sérica de potássio.

(__)Retira o potássio por troca iônica no trato gastrointestinal, com efeito que se instala entre 1 e 6 horas.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo.

(A) 2, 1, 4, 3.
(B) 2, 4, 1, 3.
(C) 3, 1, 4, 2.
(D) 3, 4, 1, 2.

Questão 35

(Correta: B)

Na chegada de paciente com dor torácica sugestiva de síndrome coronariana aguda, a equipe de emergência organiza a avaliação inicial com metas de tempo definidas. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.O eletrocardiograma de 12 derivações deve ser adquirido e interpretado em até 30 minutos do primeiro contato médico.

PORQUE

II.O traçado de 12 derivações identifica o supradesnivelamento do segmento ST e orienta o encaminhamento para a reperfusão.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
(B) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(D) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

Questão 36

(Correta: A)

No adulto que não obedece a comandos verbais após o retorno da circulação espontânea, a temperatura corporal é mantida entre 32 °C e 37,5 °C por, pelo menos, _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) 36 horas.
(B) 48 horas.
(C) 12 horas.
(D) 24 horas.

Questão 37

(Correta: A)

No pronto-socorro, a abertura da via aérea e a escolha do dispositivo de oxigênio dependem do nível de consciência, do mecanismo da lesão e da gravidade da hipoxemia. Acerca desse manejo, registre (V), para verdadeiro, e (F), para falso.

(__)Na vítima inconsciente com suspeita de lesão cervical, a via aérea é aberta pela anteriorização da mandíbula, sem extensão da cabeça.

(__)A cânula orofaríngea é indicada para manter a via aérea pérvia no paciente consciente, com reflexos de tosse e de vômito presentes.

(__)Na máscara com reservatório, indicada ao paciente com hipoxemia grave, a oferta de oxigênio é iniciada com fluxo de 15 L/min.

(__)Na máscara de Venturi, a elevação do fluxo de oxigênio acima do mínimo indicado no diluidor aumenta a fração inspirada ofertada.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) V, F, V, F.
(B) F, V, F, V.
(C) F, F, V, V.
(D) V, V, F, F.

Questão 38

(Correta: D)

A confiabilidade da gasometria arterial colhida no paciente grave depende de cuidados na coleta, no acondicionamento e no envio da amostra ao laboratório. Acerca desses cuidados, registre (V), para verdadeiro, e (F), para falso.

(__)A amostra é homogeneizada de forma suave após a coleta, para dissolver a heparina e prevenir a formação

de coágulos.

(__)A heparina líquida é indicada em lugar da seca, pois dilui a amostra e reduz a viscosidade do sangue para o analisador.

(__)A seringa plástica com a amostra é mantida em banho de gelo, pois o resfriamento reduz a difusão do oxigênio pela parede.

(__)As bolhas de ar deixadas na seringa elevam a pO_2 da amostra quando esta é inferior à pressão de oxigênio do ar ambiente.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

(A) F, F, V, V.
(B) V, V, F, F.
(C) F, V, V, F.
(D) V, F, F, V.

Questão 39

(Correta: C)

Adulto com taquicardia regular de complexo QRS (ondas Q, R e S do eletrocardiograma) largo, com pulso, hipotensão, rebaixamento do nível de consciência e sinais de choque deve receber de imediato _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) manobra vagal modificada.
(B) adenosina intravenosa em bolus.
(C) cardioversão elétrica sincronizada.
(D) amiodarona intravenosa em infusão.

Questão 40

(Correta: B)

Vítimas de trauma em choque hemorrágico recebem reposição volêmica desde o atendimento inicial, com decisões sobre o tipo e o volume de fluido a infundir. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.Na vítima em choque hemorrágico, a infusão de cristaloide é limitada enquanto se aguardam os hemocomponentes e o controle do sangramento.

PORQUE

II.O cristaloide infundido em grande volume dilui os fatores de coagulação e pode agravar a perda sanguínea.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
(C) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
(D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.