Estado de Santa Catarina

Prefeitura de Dionísio Cerqueira

CADERNO DE PROVA TIPO 4

Edital de Processo Seletivo nº 004/2026

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO



Foto: Câmara de Vereadores de Dionísio Cerqueira

AMEOSC
Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina

ATENÇÃO!

Leia atentamente as instruções constantes no verso desta capa.

ATENÇÃO! LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR.

- ***Verifique o tipo de prova indicado na capa deste caderno de prova e preencha corretamente o campo correspondente no cartão-resposta.***
- ***O cartão-resposta é o único documento válido para a correção da prova objetiva e não será substituído em hipótese alguma.***
- ***O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após decorridos 30 (trinta) minutos do início da aplicação da prova.***
- ***A interpretação das questões faz parte da avaliação, não sendo permitidos esclarecimentos ou consultas aos fiscais sobre o conteúdo da prova.***

CONFERÊNCIA DO CADERNO DE PROVA

- Confira se este caderno de prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se contém **20 (vinte) questões**, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique se há falhas de impressão, páginas faltantes, questões ilegíveis ou qualquer outra imperfeição gráfica que possa comprometer a compreensão da prova. Eventuais irregularidades deverão ser comunicadas imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações após o término da prova.
- Os cadernos de prova possuem 4 (quatro) tipos diferentes. O conteúdo das questões é idêntico para todos os candidatos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e das alternativas.

PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA

- Cada questão da prova objetiva apresenta 4 (quatro) alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, sendo apenas uma delas a resposta correta.
- Todas as respostas deverão ser transcritas para o cartão-resposta, que constitui o único documento válido para a correção da prova objetiva.
- Preencha o tipo de prova e assinale a alternativa que considerar correta conforme o exemplo apresentado a seguir:

✓ **Forma CORRETA:** ● ✗ **Forma ERRADA:** ◉ ◕ ✓ ⊘ ⊘ ⊗ Ⓐ

MATERIAIS PERMITIDOS

- Mantenha sobre a carteira apenas:
  – documento oficial de identificação;
  – caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente;
  – recipiente transparente contendo água, sem rótulo ou etiqueta.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30 (duas horas e trinta minutos)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
- O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão retirar-se simultaneamente, após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Comunicar-se com outros candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Realizar consultas de qualquer natureza, inclusive por meio de materiais impressos, equipamentos eletrônicos ou quaisquer outros recursos.
- Ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um fiscal.
- Utilizar o banheiro após a entrega do cartão-resposta.
- Permanecer no local de realização das provas após a entrega do cartão-resposta e o encerramento de sua participação no certame.

ENCERRAMENTO

- Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o **cartão-resposta** devidamente **preenchido** e **assinado**.
- Após a entrega do cartão-resposta, retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

BOA PROVA!

AMEOSC
Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina

Conhecimentos Específicos

Questão 01

A urocultura é um exame microbiológico utilizado na investigação de infecções do trato urinário (ITU). A confiabilidade do resultado depende da adequada execução das etapas pré-analíticas e analíticas, uma vez que a multiplicação bacteriana durante o transporte e o processamento inadequados pode comprometer a interpretação da contagem de colônias. Considerando as etapas convencionais da realização da urocultura, ordene os procedimentos a seguir conforme a sequência de execução.

I.Incubação das placas a 35 ± 2 °C por 18 a 24 horas, seguida da avaliação do crescimento bacteriano e da contagem de unidades formadoras de colônias por mililitro (UFC/mL).

II.Coleta da urina por jato médio, em frasco estéril, após a higiene da região genital conforme as orientações para coleta.

III.Semeadura de volume conhecido da amostra homogeneizada, com alça calibrada, em meios de cultura apropriados para o isolamento e a quantificação bacteriana.

IV.Identificação dos microrganismos isolados e realização do teste de sensibilidade aos antimicrobianos (TSA), quando indicados.

V.Encaminhamento da amostra ao laboratório em até duas horas após a coleta ou, quando esse prazo não puder ser cumprido, conservação sob refrigeração, conforme o procedimento validado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

(A) II, V, III, I, IV.
(B) V, II, III, I, IV.
(C) II, III, V, I, IV.
(D) II, V, III, IV, I.

Questão 02

Uma Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) municipal recebeu um lote de clonazepam 2 mg em comprimidos, adquirido para atender à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME). Para agilizar a separação dos pedidos destinados às unidades básicas de saúde, a equipe sugeriu armazenar o lote junto aos medicamentos de maior giro, na área comum do estoque. Considerando a legislação aplicável aos medicamentos sujeitos a controle especial e a organização da Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

(A) A inclusão do clonazepam na REMUME permite que o medicamento seja armazenado junto aos demais itens de maior giro, desde que sejam mantidos os registros de estoque e as condições gerais de conservação.
(B) A exigência de armazenamento sob chave aplica-se aos medicamentos das listas de entorpecentes, enquanto os medicamentos da lista B1 podem permanecer na área comum do estoque, desde que haja controle de acesso.
(C) O lote deve ser armazenado sob chave, em local exclusivo para esse fim, sob a responsabilidade do farmacêutico, observadas as exigências aplicáveis ao registro das movimentações.
(D) O lote pode ser armazenado na área comum do estoque, desde que as entradas e saídas sejam registradas no sistema informatizado e o acesso seja restrito aos trabalhadores da CAF.

Questão 03

Uma amostra de hemocultura de paciente internado em unidade de terapia intensiva apresentou crescimento de bacilos Gram-negativos e cocos Gram-positivos em frascos distintos. Após a identificação dos microrganismos, o laboratório realizou o teste de sensibilidade aos antimicrobianos (TSA) e a investigação de mecanismos de resistência bacteriana. Considerando os princípios de interpretação desses exames, analise as afirmativas a seguir.

I.A concentração inibitória mínima (CIM) corresponde à menor concentração do antimicrobiano capaz de reduzir em 99,9% o inóculo bacteriano inicial.

II.A produção de beta-lactamases de espectro estendido (ESBL) por Enterobacterales pode conferir resistência a cefalosporinas de terceira geração e ao aztreonam, sendo essas enzimas geralmente inibidas pelo ácido clavulânico.

III.Isolados de Klebsiella pneumoniae produtores de carbapenemase (KPC) podem apresentar resistência aos carbapenêmicos e a outras classes de betalactâmicos, incluindo cefalosporinas de terceira geração.

IV.Em isolados de Staphylococcus aureus, a positividade do teste D (D-test) indica resistência induzível à clindamicina e deve ser considerada na interpretação e no relato do resultado do TSA.

É correto o que se afirma em:

(A) I, III e IV, apenas.
(B) I, II e III, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) I e II, apenas.

Questão 04

Em um serviço de hemoterapia, o farmacêutico bioquímico participa da realização de testes imuno-hematológicos pré-transfusionais e da investigação de possíveis reações hemolíticas. Esses procedimentos apresentam finalidades distintas, relacionadas à identificação de antígenos eritrocitários e à detecção de anticorpos ou de componentes imunológicos associados às hemácias.

Associe a Coluna I, referente aos testes

imuno-hematológicos, à Coluna II, que apresenta suas respectivas finalidades.

Coluna I

1.Teste de antiglobulina direto (Coombs direto).

2.Teste de antiglobulina indireto (Coombs indireto).

3.Prova reversa da tipagem ABO.

4.Pesquisa de antígeno D com expressão fraca (D fraco).

Coluna II

(__)Detecta anticorpos livres no soro ou plasma capazes de reagir com antígenos eritrocitários, como na pesquisa de anticorpos irregulares.

(__)Identifica anticorpos anti-A e anti-B no soro ou plasma, utilizando hemácias reagentes de grupos sanguíneos conhecidos.

(__)Detecta imunoglobulinas ou componentes do complemento ligados às hemácias in vivo, sendo útil na investigação de determinadas condições hemolíticas.

(__)Utiliza a fase de antiglobulina humana para evidenciar a presença do antígeno D quando sua expressão na membrana eritrocitária é reduzida.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo.

(A) 1, 3, 2, 4.
(B) 2, 4, 1, 3.
(C) 3, 2, 1, 4.
(D) 2, 3, 1, 4.

Questão 05

Para padronizar a coleta e o processamento de amostras destinadas à realização dos exames de tempo de protrombina (TP), tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA) e fibrinogênio, um farmacêutico bioquímico organizou as etapas do procedimento fora de ordem.

I.Inspecionar o plasma quanto à presença de hemólise, lipemia e coágulos.

II.Centrifugar a amostra para obter plasma pobre em plaquetas.

III.Homogeneizar o tubo por inversão suave.

IV.Confirmar a identificação do paciente.

V.Coletar a amostra em tubo contendo citrato de sódio, respeitando a proporção adequada entre sangue e anticoagulante.

Considerando a sequência procedimental das etapas, assinale a alternativa que apresenta a ordem correta.

(A) IV, V, III, II, I.
(B) V, IV, III, II, I.
(C) I, II, IV, V, III.
(D) III, IV, V, I, II.

Questão 06

No laboratório de um hospital, o farmacêutico-bioquímico analisa amostras de líquido cefalorraquidiano (LCR), líquido pleural e urina de pacientes em investigação diagnóstica. A interpretação dos parâmetros físico-químicos e dos achados microscópicos contribui para a identificação de alterações compatíveis com diferentes condições clínicas. Com base nos conhecimentos sobre a análise desses materiais biológicos, julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F).

(__)No LCR, a pleocitose com predomínio de neutrófilos, a concentração reduzida de glicose e a concentração elevada de proteínas são achados compatíveis com meningite bacteriana.

(__)A presença de cilindros hemáticos no sedimento urinário é um achado sugestivo de sangramento de origem glomerular.

(__)A fita reagente para análise de urina é um método confiável para detectar a proteinúria de Bence Jones, pois apresenta elevada sensibilidade às cadeias leves livres de imunoglobulinas.

(__)No líquido pleural, uma relação entre a concentração de proteínas do líquido e a concentração de proteínas séricas superior a 0,5 caracteriza um transudato, segundo os critérios de Light.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

(A) F, V, V, F.
(B) V, V, F, V.
(C) V, F, V, F.
(D) V, V, F, F.

Questão 07

Um laboratório clínico municipal está organizando sua documentação para atender aos requisitos sanitários aplicáveis aos serviços que executam exames de análises clínicas (EAC). O farmacêutico bioquímico, na condição de responsável técnico, participa da implantação dos procedimentos de gestão da qualidade do serviço. Considerando a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vigente aplicável aos serviços que executam exames de análises clínicas, e suas alterações vigentes, assinale a alternativa que apresenta corretamente um requisito do Programa de Garantia da Qualidade (PGQ).

(A) O programa deve contemplar a gestão de pessoal, a educação permanente e o controle da qualidade, enquanto o gerenciamento de riscos pode ser realizado de forma independente, sem integrar o programa.

(B) O programa deve contemplar o gerenciamento dos processos operacionais e o controle da qualidade, enquanto a gestão documental pode ser substituída por registros informais mantidos pelos setores responsáveis.

(C) O programa deve contemplar o gerenciamento das tecnologias, dos riscos inerentes, dos documentos, do pessoal e dos processos operacionais, além da gestão do controle da qualidade.

(D) O programa deve contemplar o gerenciamento das tecnologias, dos riscos inerentes e dos documentos, enquanto a gestão de pessoal e dos processos operacionais integram administração geral do serviço.

Questão 08

Um laboratório de microbiologia gera culturas e estoques de microrganismos classificados como resíduos do Grupo A, subgrupo A1. O farmacêutico bioquímico responsável pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) estabelece um procedimento para o manejo desses resíduos, considerando que o tratamento será realizado na própria unidade geradora. Para padronizar o procedimento, é necessário organizar as etapas apresentadas a seguir.

I.Tratamento dos resíduos por processo validado para a redução ou eliminação da carga microbiana, em equipamento compatível com o nível III de inativação microbiana.

II.Segregação dos resíduos no momento e no local de sua geração.

III.Identificação dos recipientes de acondicionamento com os símbolos e as informações correspondentes ao risco biológico.

IV.Armazenamento externo dos recipientes, em ambiente apropriado, até a coleta externa.

V.Acondicionamento dos resíduos em recipientes compatíveis com o processo de tratamento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das etapas, conforme o procedimento descrito.

(A) V, II, III, IV, I.

(B) II, V, I, III, IV.

(C) II, III, V, I, IV.

(D) II, V, III, I, IV.

Questão 09

Uma mulher de 28 anos, assintomática, apresenta os seguintes resultados laboratoriais: hemoglobina de 10,8 g/dL; contagem de eritrócitos de 5,3 milhões/µL; volume corpuscular médio (VCM) de 64 fL; amplitude de distribuição dos eritrócitos (RDW) de 13,2%; ferritina de 180 ng/mL; e hemoglobina A2 (HbA2) de 5,2%. Considerando os achados laboratoriais e os princípios utilizados no diagnóstico diferencial das anemias microcíticas, analise as afirmativas a seguir.

I.A microcitose acentuada, associada à contagem de eritrócitos relativamente elevada e ao RDW normal, favorece a hipótese de talassemia menor em relação à anemia ferropriva.

II.Em processos inflamatórios, a ferritina pode apresentar concentração normal ou elevada, mesmo na presença de deficiência de ferro, devendo ser interpretada em conjunto com outros parâmetros laboratoriais.

III.A elevação da hemoglobina A2 constitui um achado que sustenta a hipótese de beta-talassemia menor, embora a deficiência de ferro concomitante possa influenciar sua concentração.

IV.O índice de Mentzer, calculado pela divisão do VCM pela contagem de eritrócitos, quando inferior a 13, favorece a hipótese de anemia ferropriva em relação à talassemia.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, II e III, apenas.

(B) I e III, apenas.

(C) II e IV, apenas.

(D) II, III e IV apenas.

Questão 10

Um paciente de 58 anos, internado por desidratação em um hospital público, teve uma amostra de sangue coletada e encaminhada ao setor de bioquímica para realização de exames laboratoriais. A solicitação incluía dosagens de transaminases, fosfatase alcalina, ureia, creatinina e perfil lipídico. Antes da liberação dos resultados, o farmacêutico responsável deve considerar possíveis interferências pré-analíticas e aspectos fisiopatológicos relevantes para a interpretação dos exames. Analise as afirmativas a seguir.

I.Na lesão hepatocelular aguda, a elevação da alanina aminotransferase (ALT) tende a ser proporcionalmente maior que a da fosfatase alcalina (FA), enquanto o aumento predominante da FA é mais característico de padrões colestáticos.

II.A hemólise in vitro pode provocar elevação falsamente aumentada da concentração de potássio e da atividade da aspartato aminotransferase (AST), em razão da liberação de componentes intracelulares das hemácias.

III.A fórmula de Friedewald para estimativa do colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDL) pode ser utilizada sem restrições quando a concentração de triglicerídeos ultrapassa 400 mg/dL, desde que os valores de colesterol total e HDL (lipoproteína de alta densidade) sejam obtidos corretamente.

IV.Em um paciente com desidratação, a elevação desproporcional da ureia em relação à creatinina pode ser compatível com redução da perfusão renal, embora esse achado deva ser interpretado em conjunto com outros dados clínicos e laboratoriais.

Está correto o que se afirma em:

(A) III e IV, apenas.

(B) II, III e IV, apenas.

(C) I, II e IV, apenas.

(D) I e II, apenas.

Questão 11

Os ensaios imunológicos desempenham papel importante no rastreamento e no diagnóstico de doenças. Essas metodologias se baseiam na interação específica entre antígenos e anticorpos e apresentam diferentes princípios de detecção, características analíticas e aplicações laboratoriais. Com relação aos métodos de imunodiagnóstico, analise as afirmativas a seguir.

I.Os ensaios imunoenzimáticos (ELISA) do tipo sanduíche utilizam anticorpos de captura imobilizados em uma fase sólida para reter antígenos específicos presentes na amostra, que são posteriormente reconhecidos por outro anticorpo.

II.Nas reações de aglutinação passiva, antígenos solúveis podem ser fixados a partículas carreadoras inertes, como o látex, permitindo a formação de agregados visíveis pela interação com anticorpos específicos.

III.Os ensaios de quimiluminescência são empregados em testes rápidos de leitura visual, dispensam equipamentos específicos e apresentam, em geral, menor sensibilidade analítica que as reações de aglutinação direta.

IV.O fenômeno de prozona em reações de aglutinação decorre do excesso de antígenos em relação aos anticorpos, o que impede a formação de agregados visíveis e pode produzir resultados falsamente positivos.

Está correto o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.

(B) I e IV, apenas.

(C) III e IV, apenas.

(D) II e III, apenas.

Questão 12

Em um laboratório clínico, o farmacêutico bioquímico designado para responder pelas atividades do serviço acompanha os procedimentos analíticos, verifica a conformidade dos processos e adota providências diante de não conformidades que possam comprometer a confiabilidade dos resultados. Essa atuação deve observar as exigências legais e sanitárias aplicáveis ao estabelecimento.

Nesse contexto, a modalidade de responsabilidade profissional exercida pelo farmacêutico na situação descrita é denominada responsabilidade _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) técnica

(B) clínica

(C) jurídica

(D) administrativa

Questão 13

O diagnóstico laboratorial das parasitoses requer a seleção do método conforme as características biológicas do parasito e o material biológico analisado. Na pesquisa de larvas em amostras fecais frescas, o método de Baermann-Moraes, baseado no hidrotropismo e no termotropismo positivos, é indicado principalmente para a detecção de larvas de _____. A técnica da fita adesiva (Graham), aplicada na região perianal, é utilizada para a pesquisa de ovos de _____. Na suspeita de malária, o método microscópico de referência, cuja maior sensibilidade favorece a detecção do parasito em baixas parasitemias, é a _____, enquanto o esfregaço delgado facilita a diferenciação das espécies.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem.

(A) Strongyloides stercoralis, Ancylostoma duodenale, gota espessa

(B) Strongyloides stercoralis, Enterobius vermicularis, gota espessa

(C) Strongyloides stercoralis, Enterobius vermicularis, esfregaço delgado

(D) Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, gota espessa

Questão 14

Considerando os padrões bioquímicos associados à função tireoidiana, à investigação de eventos cardíacos agudos e à triagem neonatal de erros inatos do metabolismo, julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F).

(__)No hipotireoidismo primário, a redução da tiroxina livre (T4 livre) geralmente está associada à elevação do hormônio estimulante da tireoide (TSH), em decorrência da resposta do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide à diminuição dos hormônios tireoidianos circulantes.

(__)No hipotireoidismo central, decorrente de disfunção hipofisária ou hipotalâmica, a concentração de TSH costuma estar acentuadamente elevada diante da redução da T4 livre.

(__)Na fenilcetonúria clássica, a deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase compromete a conversão de fenilalanina em tirosina, ocasionando aumento da concentração sanguínea de fenilalanina.

(__)Na investigação laboratorial do infarto agudo do miocárdio, a elevação isolada da creatinoquinase fração MB (CK-MB), sem elevação das troponinas cardíacas, apresenta maior especificidade para lesão miocárdica do que a elevação das troponinas cardíacas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

(A) V, V, F, F.
(B) V, F, V, F.
(C) F, V, V, F.
(D) V, F, F, V.

Língua Portuguesa

Questão 15

As regras ortográficas estabelecem critérios para a formação e a grafia das palavras, incluindo o emprego do hífen em construções formadas com prefixos. A aplicação dessas regras exige observar os elementos que entram na composição do vocábulo e as letras que se encontram no ponto de união.

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.A forma "antissocial" é grafada sem hífen e com duplicação da consoante "s".

PORQUE

II.Nas formações com prefixo terminado em vogal, diante de palavra iniciada por "r" ou "s", elimina-se o hífen e duplica-se essa consoante.

Assinale a alternativa correta.

(A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
(D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

Questão 16

Os tipos textuais apresentam formas distintas de organização da linguagem e são reconhecidos pelas características que estruturam o conteúdo. Narração, descrição, argumentação, exposição e injunção estabelecem diferentes relações entre as informações e a finalidade do texto.

Sobre os tipos textuais, analise as assertivas a seguir:

I.Na tipologia narrativa, os acontecimentos articulam-se em uma sequência que envolve ações, mudanças e desenvolvimento temporal.

II.Na tipologia descritiva, a caracterização de seres, objetos, ambientes ou situações organiza o conteúdo por meio da apresentação de seus aspectos.

III.Na tipologia expositiva, a organização das informações sustenta uma tese por meio de argumentos articulados em defesa de determinado posicionamento.

IV.Na tipologia injuntiva, a linguagem organiza orientações dirigidas ao destinatário, indicando ações ou procedimentos a serem realizados em determinada sequência.

Assinale a alternativa correta.

(A) I, III e IV estão corretas.
(B) II, III e IV estão corretas.
(C) I, II e IV estão corretas.
(D) I, II e III estão corretas.

Questão 17

A leitura amplia o repertório de quem mantém contato frequente com diferentes gêneros, e esse hábito favorece a compreensão de novas ideias. Muitas pessoas percebem que determinados textos exigem maior atenção quando apresentam conceitos pouco familiares.

Considerando as relações sintáticas estabelecidas no trecho, assinale a alternativa correta.

(A) A oração "que determinados textos exigem maior atenção" é subordinada substantiva objetiva direta, pois completa o sentido do verbo "percebem" sem preposição.
(B) A oração "quando apresentam conceitos pouco familiares" é subordinada adverbial causal, pois indica a razão que determina a exigência de maior atenção.
(C) A oração "e esse hábito favorece a compreensão de novas ideias" é subordinada adverbial consecutiva, pois apresenta uma consequência vinculada à prática da leitura.
(D) A oração "quando apresentam conceitos pouco familiares" é subordinada adverbial condicional, pois estabelece uma condição para que determinados textos exijam maior atenção.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

A incorporação de uma nova vacina pneumocócica ao Sistema Único de Saúde ampliou a proteção oferecida às crianças contra diferentes tipos da bactéria responsável por doenças como pneumonia e meningite. Considerando a importância dessa medida para a saúde pública, assinale a alternativa correta.

(A) A ampliação da cobertura vacinal permite concentrar medidas preventivas nas crianças vacinadas e reduzir o acompanhamento dos demais grupos vulneráveis.
(B) A oferta de vacina com proteção mais abrangente permite restringir as demais medidas preventivas aos períodos de maior circulação das doenças pneumocócicas.
(C) A ampliação da cobertura vacinal pode reduzir formas graves de doenças pneumocócicas e contribuir para diminuir complicações e internações.

(D) A incorporação de nova vacina permite substituir ações de vigilância das doenças pneumocócicas pelo acompanhamento periódico da cobertura de imunização.

Questão 19

O art. 24 da Lei Orgânica do Município de Dionísio Cerqueira (SC) disciplina a possibilidade de instituição de regime de previdência complementar para determinada categoria de agentes públicos municipais. Considerando exclusivamente as disposições do artigo, assinale a alternativa correta.

(A) O Município poderá instituir regime de previdência complementar para servidores efetivos, sem vinculação ao limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para aposentadorias e pensões do regime próprio.

(B) O Município poderá instituir, mediante lei de iniciativa do Poder Legislativo, regime de previdência complementar destinado aos servidores efetivos e aos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão.

(C) O Município deverá instituir, mediante ato do Poder Executivo, regime de previdência complementar para todos os agentes públicos municipais, independentemente da natureza do vínculo funcional, observados o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

(D) O Município poderá instituir, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observados o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social e a Constituição Federal.

Questão 20

A posição de Dionísio Cerqueira na fronteira com a Argentina influencia sua dinâmica econômica. Além das atividades relacionadas à agricultura, o município apresenta circulação de pessoas e mercadorias e dispõe de infraestrutura aduaneira associada ao comércio internacional. Considerando as relações entre localização geográfica e economia municipal, analise as assertivas:

I.A presença de infraestrutura aduaneira favorece atividades relacionadas aos fluxos de importação e exportação.

II.A localização na fronteira pode estimular atividades comerciais e de serviços vinculadas à circulação de pessoas e mercadorias.

III.A relevância do comércio internacional torna incompatível a manutenção de atividades agropecuárias na economia do município.

IV.A posição fronteiriça pode ampliar a importância econômica de atividades de transporte, logística e prestação de serviços.

V.A existência de uma fronteira internacional elimina a influência das atividades econômicas desenvolvidas no espaço rural do município.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, III e IV, apenas.

(B) I, II e IV, apenas.

(C) II, III e IV, apenas.

(D) I, II e V, apenas.

AMEOSC

Associação dos Municípios do
Extremo Oeste de Santa Catarina

(49) 3621-0795

ameosc@ameosc.org.br

Segundo Aníbal Balbinot, 189
Agostini, São Miguel do Oeste/SC

@ameoscoficial

www.ameosc.org.br